

薬効・薬価リスト平成24年版 追補
(平成24年8月28日告示分)

内 用 薬

インライタ錠 1mg (ファイザー)	1mg1錠 劇 2,006.20 4291027F1029 / 622183301
" 錠 5mg	5mg1錠 劇 9,094.40 4291027F2025 / 622183401

4291 抗悪性腫瘍剤 アキシチニブ

適応 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌。

用法 1回5mg,1日2回経口投与。状態により適宜増減。1回10mg,1日2回まで増量可。

禁忌 本剤(成分)に過敏症の既往歴 妊婦・妊娠している可能性の婦人

(薬価基準収載日:平24.8.28,投与:14日まで)

ケアラム錠 25mg (エーザイ)	25mg1錠 劇 150.50 3999031F1035 / 622184501
----------------------	---

3999i 抗リウマチ剤 イグラチモド

適応 関節リウマチ。

用法 1日1回25mgを朝食後,4週間以上経口投与。以降,1回25mg,1日2回,朝・夕食後に増量。

禁忌 妊婦・妊娠している可能性の婦人 重篤な肝障害 消化性潰瘍 本剤(成分)に過敏症の既往歴

(薬価基準収載日:平24.8.28,投与:14日まで)

コルベット錠 25mg (富山化学=大正富山)	25mg1錠 劇 150.50 3999031F1027 / 622183501
----------------------------	---

3999i 抗リウマチ剤 イグラチモド

適応 関節リウマチ。

用法 1日1回25mgを朝食後,4週間以上経口投与。以降,1回25mg,1日2回,朝・夕食後に増量。

禁忌 妊婦・妊娠している可能性の婦人 重篤な肝障害 消化性潰瘍 本剤(成分)に過敏症の既往歴

(薬価基準収載日:平24.8.28,投与:14日まで)

テネリア錠 20mg (田辺三菱=第一三共)	20mg1錠 207.70 3969015F1029 / 622182601
---------------------------	---

3969i 2型糖尿病治療剤 テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物

適応 次のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合の2型糖尿病/食事療法・運動療法のみ,食事療法・運動療法に加えてSU剤・チアゾリジン系薬剤のいずれかを使用。

用法 1日1回20mg,経口投与。効果不十分な場合,経過を十分に観察しながら1日1回40mgに増量可。

禁忌 本剤(成分)に過敏症の既往歴 重症ケトosis,糖尿病性昏睡または前昏睡,1型糖尿病 重症感染症,手術前後,重篤な外傷

(薬価基準収載日:平24.8.28,投与:14日まで)

レキップCR錠 2mg (GSK)	2mg1錠 劇 273.60 1169013G1022 / 622183601
" CR錠 8mg	8mg1錠 劇 941.40 1169013G2029 / 622183701

1169i 徐放性ドパミン D₂ 受容体系作動薬 ロピニロール塩酸塩

適応 パーキンソン病。

用法 1日1回2mgから開始,2週目に4mg/日とする。以後,必要により2mg/日ずつ1週間以上の間隔で増量。いずれの投与量でも1日1回経口投与。年齢・症状により適宜増減。1日16mgを超えない。

保険外 ロピニロール塩酸塩製剤のパーキンソン病患者への使用に当たっては,原則としてロピニロール塩酸塩徐放性製剤(本製剤)を使用(平24.8.28保医発0828第1号)。

禁忌 本剤(成分)に過敏症の既往歴 妊婦・妊娠している可能性の婦人

(薬価基準収載日:平24.8.28,投与:14日まで)

外 用 薬

オーキシス 9µg タービュヘイラー28吸入 (アストラゼネカ=MeijiSeika)	252µg1キット(9µg) 1,660.00 2259711G1024 / 622180901
---	---

2259i ドライパウダー吸入式気管支拡張剤 ホルモテロールフルマル酸塩水和物

適応 慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎,肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解。

用法 1回9µg(1吸入),1日2回。

禁忌 本剤(成分)に過敏症の既往歴

(薬価基準収載日:平24.8.28,投与:14日まで)

注 射 薬

ゴナックス皮下注用 80mg (アステラス)	80mg1瓶 劇 23,693 2499412D1024 / 622182701
" 皮下注用 120mg	120mg1瓶 劇 29,126 2499412D2020 / 622182801

2499i 前立腺癌治療剤 デガレリクス酢酸塩

適応 前立腺癌。

用法 [初回]240mgを1ヶ所あたり120mgずつ,腹部2ヶ所に皮下注。120mg瓶を注射用水3mLで溶解。[2回目以降]初回投与4週間後より,維持量80mgを腹部1ヶ所に皮下注。4週間間隔で繰り返す。80mg瓶を注射用水4.2mLで溶解。

禁忌 本剤(成分)に過敏症の既往歴