

薬効・薬価リスト平成26年版 追補情報(平成26年6月)

I. ジェネリック(後発医薬品)とそれに対応する先発・代表薬一覧表(内用薬)

平成26年6月20日告示品目における診療報酬上の後発医薬品と、それに対応する先発・代表薬をまとめています(平成26年7月4日現在、入手できた情報による)。
 薬効分類・成分名別に掲載しています。
 商品名の左に「後」とあるものが、診療報酬上の後発医薬品です。
 背景色が、先発・代表薬を指します(便宜的に後発医薬品等を選択している場合があります)。
 成分内において、適応や用法に違いがあり、かつ簡便に記号で分類できる場合、薬価欄の右に対応する番号とともに表記しました。記号は
 ○: 適応ないし用法あり
 △: 適応ないし用法を持つが、一部に違いあり
 -: 適応・用法なし
 を使用しています。これらはあくまで簡便な分類ですので、各成分別表記末尾の適応・用法表記とあわせてご覧ください。
 また一覧は対象品目を抜粋したもので、必ずしも同成分の品目全てに当てはまりません。さらに、作成時の情報から更新・変更されている場合がありますので、処方・調剤にあたっては必ず最新の添付文書をご確認ください。

1124 アルブラゾラム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	コンスタン0.4mg錠	0.4mg1錠	武田	9.40	先発・代表薬
	ソナックス0.4mg錠	0.4mg1錠	ファイザー	9.20	先発・代表薬
後	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg1錠	メディサ=沢井	5.60	H26.6.20収載
	コンスタン0.8mg錠	0.8mg1錠	武田	15.50	先発・代表薬
	ソナックス0.8mg錠	0.8mg1錠	ファイザー	15.50	先発・代表薬
後	アルブラゾラム錠0.8mg「サワイ」	0.8mg1錠	メディサ=沢井	8.20	H26.6.20収載

【適応】心身症(胃・十二指腸潰瘍、過敏性腸症候群、自律神経失調症)における身体症候・不安・緊張・抑うつ・睡眠障害。【用法】1日1.2mg、分3。増量の場合、最高量1日2.4mgまで増量、分3~4。高齢者は1回0.4mg、1日1~2回から開始。増量の場合1日1.2mgまで。

1124 トフィンパム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	グラダキシン細粒10%	10%1g	持田	27.70	先発・代表薬
後	トフィンパム細粒10%「ツルハラ」	10%1g	鶴原	9.00	H26.6.20収載

【適応】次の疾患における頭痛・頭重・倦怠感・心悸亢進・発汗等の自律神経症状/自律神経失調症、頭部損傷、頸部損傷、更年期障害、卵巣欠落症状。【用法】1回50mg(細粒:0.5g)、1日3回。

1124 トリアゾラム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg1錠	ファイザー	10.20	先発・代表薬
後	トリアゾラム錠0.125mg「KN」	0.125mg1錠	小林化工	5.60	H26.6.20収載
	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg1錠	ファイザー	14.70	先発・代表薬
後	トリアゾラム錠0.25mg「KN」	0.25mg1錠	小林化工	5.80	H26.6.20収載

【適応】①不眠症。②麻酔前投薬。【用法】①1回0.25mg、就寝前。高度不眠症0.5mg。高齢者1回0.125~0.25mgまで。②手術前夜1回0.25mg、就寝前。年齢・症状・疾患により、0.5mg投与可。

1124 フルニトラゼパム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	サイレース錠1mg	1mg1錠	エーザイ	15.10	先発・代表薬
	ロヒプノール錠1	1mg1錠	中外	14.20	先発・代表薬
後	フルニトラゼパム錠1mg「SN」	1mg1錠	シオノ=摩耶堂	5.60	H26.6.20収載

【適応】不眠症。麻酔前投薬。【用法】1回0.5~2mg、就寝前又は手術前。高齢者1回1mgまで。

1124 ロフラゼブ酸エチル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	メイラックス錠1mg	1mg1錠	MeijiSeika	21.60	先発・代表薬
後	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「トーワ」	1mg1錠	東和薬品	8.00	H26.6.20収載

【適応】心身症(胃・十二指腸潰瘍、慢性胃炎、過敏性腸症候群、自律神経失調症)・神経症における不安・緊張・抑うつ・睡眠障害。【用法】1日2mg、分1~2。

1139i パルプロ酸ナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	デバケン錠100mg	100mg1錠	協和発酵キリン	9.90	先発・代表薬
後	パルプロ酸Na錠100mg「TCK」	100mg1錠	辰巳	9.10	H26.6.20収載
	デバケン錠200mg	200mg1錠	協和発酵キリン	14.60	先発・代表薬
後	パルプロ酸Na錠200mg「TCK」	200mg1錠	辰巳=日本ジェネリック	6.10	H26.6.20収載

【適応】①次の疾患の治療/各種てんかん(小発作、焦点発作、精神運動発作、混合発作)、てんかんに伴う性格行動障害(不機嫌、易怒性等)、躁病・躁うつ病の躁状態。②片頭痛発作の発症抑制。【用法】①1日400~1,200mg、分2~3。②1日400~800mg、分2~3。1日1,000mgまで。

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

1147 ジクロフェナクナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ボルタレン錠25mg	25mg1錠	ノバルティス	13.10	先発・代表薬
後	ジクロフェナクNa錠25mg「NP」	25mg1錠	ニプロ	5.60	H26.6.20収載
後	ジクロフェナクNa錠25mg「TCK」	25mg1錠	辰巳＝日本ジェネリック	5.60	H26.6.20収載
後	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	25mg1錠	沢井	5.60	H26.6.20収載

【適応】①次の疾患・症状の鎮痛・消炎／関節リウマチ、変形性関節症、変形性脊椎症、腰痛症、腱鞘炎、頸肩腕症候群、神経痛、後陣痛、骨盤内炎症、月経困難症、膀胱炎、前眼部炎症、歯痛、手術後、抜歯後。②次の疾患の解熱・鎮痛／急性上気道炎（急性気管炎を伴う急性上気道炎を含む）。【用法】①1日75～100mg、分3。頓用は25～50mg。②1回25～50mg、頓用。原則として1日2回まで、1日最大100mg。

1149i エトドラク

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	オステラック錠100	100mg1錠	あすか製薬＝武田	19.70	先発・代表薬
	ハイベン錠100mg	100mg1錠	日本新薬	19.70	先発・代表薬
後	エトドラク錠100mg「SW」	100mg1錠	沢井	8.80	H26.6.20収載
	オステラック錠200	200mg1錠	あすか製薬＝武田	27.60	先発・代表薬
	ハイベン錠200mg	200mg1錠	日本新薬	27.60	先発・代表薬
後	エトドラク錠200mg「SW」	200mg1錠	沢井＝旭化成ファーマ	12.60	H26.6.20収載

【適応】次の疾患・症状の消炎・鎮痛／関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸腕症候群、腱鞘炎、手術後、外傷後。【用法】1日400mg、分2朝・夕食後。

1162 ビペリデン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アキネトン錠1mg	1mg1錠	大日本住友	5.60	先発・代表薬
後	ビペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」	2mg1錠	沢井	5.60	H26.6.20収載／先発・代表薬に同一規格なし

【適応】向精神薬投与によるパーキンソニズム・遅発性を除くジスキネジア・アカシジア。特発性パーキンソニズム。その他のパーキンソニズム（脳炎後、動脈硬化性、中毒性）。【用法】初期量1回1mg、1日2回。その後漸増、1日3～6mgを分服。

1169i ペルゴリドメシル酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ペルマックス錠50μg	50μg1錠	協和発酵キリン	50.00	先発・代表薬
後	ペルゴリド錠50μg「ファイザー」	50μg1錠	マイラン＝ファイザー	29.30	H26.6.20収載
	ペルマックス錠250μg	250μg1錠	協和発酵キリン	207.40	先発・代表薬
後	ペルゴリド錠250μg「ファイザー」	250μg1錠	マイラン＝ファイザー＝日本ジェネリック	117.40	H26.6.20収載

【適応】パーキンソン病。【用法】通常、L-dopa製剤と併用。ペルゴリドとして1日1回50μg、夕食直後2日間。以後、2、3日ごとに1日50μgずつ増量、第1週末には1日150μg。第2週目は1日300μgから開始し、2、3日ごとに1日150μgずつ増量、第2週末には1日600μg。第3週目は1日750μgから開始。標準維持量1日750～1、250μg。以上、1日100μgの場合は朝・夕食直後、150μg以上の場合は毎食直後に分服。

1179i エチゾラム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	デバス錠0.5mg	0.5mg1錠	田辺三菱＝吉富薬品	9.00	先発・代表薬
後	エチゾラム錠0.5mg「日新」	0.5mg1錠	日新製薬	6.30	H26.6.20収載
	デバス錠1mg	1mg1錠	田辺三菱＝吉富薬品	13.00	先発・代表薬
後	エチゾラム錠1mg「日新」	1mg1錠	日新製薬	6.40	H26.6.20収載

【適応】①神経症における不安・緊張・抑うつ・神経衰弱症状・睡眠障害。うつ病における不安・緊張・睡眠障害。②心身症（高血圧症、胃・十二指腸潰瘍）における身体症状・不安・緊張・抑うつ・睡眠障害。次の疾患における不安・緊張・抑うつ・筋緊張／頸椎症、腰痛症、筋収縮性頭痛。③統合失調症における睡眠障害。【用法】①1日3mg、分3。②1日1.5mg、分3。③1～3mg、就寝前1回。以上、高齢者は1日1.5mgまで。

1179i クエチアピンフマル酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	セロクエル細粒50%	50%1g	アステラス	702.20	先発・代表薬
後	クエチアピン細粒50%「ヨシトミ」	50%1g	田辺三菱＝田辺販売＝吉富薬品	328.10	H26.6.20収載
	セロクエル25mg錠	25mg1錠	アステラス	41.50	先発・代表薬
後	クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」	25mg1錠	田辺三菱＝田辺販売＝吉富薬品＝ニプロ	18.80	H26.6.20収載
	セロクエル100mg錠	100mg1錠	アステラス	143.80	先発・代表薬
後	クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」	100mg1錠	田辺三菱＝田辺販売＝吉富薬品＝ニプロ	64.90	H26.6.20収載
	セロクエル200mg錠	200mg1錠	アステラス	268.70	先発・代表薬
後	クエチアピン錠200mg「ヨシトミ」	200mg1錠	田辺三菱＝田辺販売＝吉富薬品＝ニプロ	118.70	H26.6.20収載

【適応】統合失調症。【用法】1回25mg（細粒：0.05g）、1日2～3回より開始し漸増。通常、1日150～600mg（同0.3～1.2g）、分2～3。1日750mg（同1.5g）まで。

1179i トラゾドン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	デジレル錠25	25mg1錠	ファイザー	18.10	先発・代表薬
	レスリン錠25	25mg1錠	MSD	18.10	先発・代表薬
後	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg1錠	共和薬品	8.10	H26.6.20収載
	デジレル錠50	50mg1錠	ファイザー	31.70	先発・代表薬
	レスリン錠50	50mg1錠	MSD	31.70	先発・代表薬
後	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	50mg1錠	共和薬品	14.10	H26.6.20収載

【適応】うつ病、うつ状態。【用法】1日75～100mgを初期用量とし、1日200mgまで増量、分1～数回。

1179i ハロペリドール

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	セレネース錠0.75mg	0.75mg1錠	大日本住友	7.80	先発・代表薬
後	ハロペリドール錠0.75mg「JG」	0.75mg1錠	長生堂＝日本ジェネリック	5.90	H26.6.20収載
	セレネース錠1mg	1mg1錠	大日本住友	7.80	先発・代表薬
後	ハロペリドール錠1mg「JG」	1mg1錠	長生堂＝日本ジェネリック	6.00	H26.6.20収載
	セレネース錠1.5mg	1.5mg1錠	大日本住友	9.40	先発・代表薬
後	ハロペリドール錠1.5mg「JG」	1.5mg1錠	長生堂＝日本ジェネリック	6.00	H26.6.20収載
	セレネース錠3mg	3mg1錠	大日本住友	10.40	先発・代表薬
後	ハロペリドール錠3mg「JG」	3mg1錠	長生堂＝日本ジェネリック	6.30	H26.6.20収載

【適応】統合失調症、躁病。【用法】初回量1日0.75～2.25mg、以後漸増。維持量1日3～6mg。

1179i マプロチリン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ルジオミール錠10mg	10mg1錠	ノバルティス	12.60	先発・代表薬
後	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	10mg1錠	共和薬品	6.80	H26.6.20収載
	ルジオミール錠25mg	25mg1錠	ノバルティス	25.60	先発・代表薬
後	マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg1錠	共和薬品	14.70	H26.6.20収載
後	マプロチリン塩酸塩錠50mg「アメル」	50mg1錠	共和薬品	29.00	H26.6.20収載

【適応】うつ病、うつ状態。【用法】1日30～75mg、分2～3、又は1日1回夕食後あるいは就寝前も可。

1225 クロルフェニンカルバミン酸エステル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	リンラキサー錠125mg	125mg1錠	大正製薬＝大正富山	10.00	先発・代表薬
後	クロルフェニンカルバミン酸エステル錠125mg「サワイ」	125mg1錠	沢井	6.20	H26.6.20収載
	リンラキサー錠250mg	250mg1錠	大正製薬＝大正富山	16.40	先発・代表薬
後	クロルフェニンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」	250mg1錠	沢井	6.20	H26.6.20収載

【適応】運動器疾患に伴う有痛性痙攣(腰背痛症、変形性脊椎症、椎間板ヘルニア、脊椎分離症、脊椎捻り症、脊椎骨粗鬆症、頸肩腕症候群)。【用法】1回250mg、1日3回。

1242 ブチルスコポラミン臭化物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ブスコパン錠10mg	10mg1錠	日本ベーリンガー	7.20	先発・代表薬
後	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	10mg1錠	鶴原	5.40	H26.6.20収載

【適応】次の疾患における痙攣・運動機能亢進／胃潰瘍、十二指腸潰瘍、食道痙攣、幽門痙攣、胃炎、腸炎、腸痙攣、痙攣性便秘、機能性下痢、胆のう炎、胆管炎、胆石症、胆道ジスキネジー、胆のう切除後の後遺症、尿路結石症、膀胱炎、月経困難症。【用法】1回10～20mg、1日3～5回。

1249i チザニジン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	テルネリン錠1mg	1mg1錠	ノバルティス	16.70	先発・代表薬
後	チザニジン錠1mg「サワイ」	1mg1錠	沢井	5.90	H26.6.20収載

【適応】①次の疾患による筋緊張状態の改善／頸肩腕症候群、腰痛症。②次の疾患による痙攣麻痺／脳血管障害、痙攣性脊髄麻痺、頸部脊椎症、脳性(小児)麻痺、外傷後遺症(脊髄損傷後遺症、頭部外傷後遺症)、脊髄小脳変性症、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症。【用法】チザニジンとして①1日3mg、分3。②1日3mgより開始、1日6～9mgまで漸増、分3。

2119i ユビデカレノン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ノイキンカプセル5mg	5mg1カプセル	エーザイ	13.80	先発・代表薬
後	ユビデカレノンカプセル5mg「ツルハラ」	5mg1カプセル	鶴原	5.80	H26.6.20収載

【適応】基礎治療施行中の軽度～中等度のうつ血性心不全症状。【用法】1回10mg、1日3回。

2123 ビソプロロールフマル酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	メインテート錠0.625mg	0.625mg1錠	田辺三菱	22.10	先発・代表薬
後	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」	0.625mg1錠	東和薬品	9.90	H26.6.20収載

【適応】次の状態で、アンジオテンシン変換酵素阻害薬又はアンジオテンシンII受容体拮抗薬、利尿薬、ジギタリス製剤等の基礎治療を受けている者／虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不全。【用法】1日1回0.625mgから開始、2週間以上投与して忍容性がある場合、1日1回1.25mgに増量。その後4週間以上の間隔で段階的に増量、忍容性がない場合は減量。増減は1回量0.625mg、1.25mg、2.5mg、3.75mg、又は5mgとし必ず段階的に行い、いずれも1日1回。維持量1日1回1.25～5mg。最高量1日1回5mg。

2132 トリクロルメチアジド

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	フルイトラン錠2mg	2mg1錠	塩野義	9.60	先発・代表薬
後	トリクロルメチアジド錠2mg「ツルハラ」	2mg1錠	鶴原	6.00	H26.6.20収載

【適応】高血圧症(本態性、腎性等)、悪性高血圧、心性浮腫(うっ血性心不全)、腎性浮腫、肝性浮腫、月経前緊張症。【用法】1日2～8mg、分1～2。高血圧症には少量より開始し漸増。悪性高血圧に用いる場合は通常、他の降圧剤と併用。

2139i フロセミド

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ラシックス錠20mg	20mg1錠	サノフィ=日医工	9.60	先発・代表薬
後	フロセミド錠20mg「テバ」	20mg1錠	テバ製薬	6.00	H26.6.20収載
	ラシックス錠40mg	40mg1錠	サノフィ=日医工	14.70	先発・代表薬
後	フロセミド錠40mg「テバ」	40mg1錠	テバ製薬	6.30	H26.6.20収載

【適応】本態性高血圧症。腎性高血圧症、悪性高血圧、心性浮腫(うっ血性心不全)、腎性浮腫、肝性浮腫、月経前緊張症、末梢血管障害による浮腫、尿路結石排出促進。【用法】1日1回40～80mg、連日又は隔日。腎機能不全等の場合にはさらに大量を用いることもある。悪性高血圧には通常、他の降圧剤と併用。

2144 エナラプリルマレイン酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	レニベース錠2.5	2.5mg1錠	MSD	35.60	先発・代表薬
後	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ケミファ」	2.5mg1錠	日本薬工=ケミファ=興和ジェネリック	14.40	H26.6.20収載
	レニベース錠5	5mg1錠	MSD	66.50	先発・代表薬
後	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ケミファ」	5mg1錠	日本薬工=ケミファ=興和ジェネリック	22.90	H26.6.20収載

【適応】①本態性高血圧症、腎性高血圧症、腎血管性高血圧症、悪性高血圧。②慢性心不全(軽症～中等症)の状態で、ジギタリス製剤、利尿剤等の基礎治療剤を投与しても十分効果が認められない場合。【用法】①成人1日1回5～10mg。腎性・腎血管性高血圧症又は悪性高血圧には2.5mgから投与することが望ましい。生後1ヶ月以上の小児1日1回0.08mg/kg。②ジギタリス製剤、利尿剤等と併用。成人1日1回5～10mg。腎障害を伴う患者又は利尿剤投与中の患者では2.5mgから投与することが望ましい。

2144 シラザプリル水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	インヒベース錠0.25	0.25mg1錠	中外	21.50	先発・代表薬
後	シラザプリル錠0.25mg「トーフ」	0.25mg1錠	東和薬品	18.50	H26.6.20収載
	インヒベース錠0.5	0.5mg1錠	中外	35.70	先発・代表薬
後	シラザプリル錠0.5mg「トーフ」	0.5mg1錠	東和薬品	21.70	H26.6.20収載
	インヒベース錠1	1mg1錠	中外	53.70	先発・代表薬
後	シラザプリル錠1mg「トーフ」	1mg1錠	東和薬品	27.30	H26.6.20収載

【適応】高血圧症。【用法】シラザプリル(無水物)として1日1回、0.5mgより開始し、以後漸増。最大1日1回2mgまで。重症又は腎障害を伴う患者は1日1回0.25mgから投与開始。

2144 トランドラプリル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	オドリック錠0.5mg	0.5mg1錠	日本新薬	36.30	先発・代表薬
	ブレラン0.5mg錠	0.5mg1錠	サノフィ	36.30	先発・代表薬
後	トランドラプリル錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	沢井	24.80	H26.6.20収載
	オドリック錠1mg	1mg1錠	日本新薬	65.00	先発・代表薬
	ブレラン1mg錠	1mg1錠	サノフィ	65.00	先発・代表薬
後	トランドラプリル錠1mg「サワイ」	1mg1錠	沢井	30.70	H26.6.20収載

【適応】高血圧症。【用法】1日1回1～2mg。重症高血圧症又は腎障害を伴う高血圧症には0.5mgから投与開始が望ましい。

2144 リシノプリル水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ロンゲス錠5mg	5mg1錠	塩野義	38.70	先発・代表薬
	ゼストリル錠5	5mg1錠	アストラゼネカ	33.50	先発・代表薬
後	リシノプリル錠5mg「サワイ」	5mg1錠	沢井	13.80	H26.6.20収載
	ロンゲス錠10mg	10mg1錠	塩野義	66.80	先発・代表薬
	ゼストリル錠10	10mg1錠	アストラゼネカ	54.20	先発・代表薬
後	リシノプリル錠10mg「サワイ」	10mg1錠	沢井	21.00	H26.6.20収載

【適応】①高血圧症。②次の状態でジギタリス製剤、利尿剤等の基礎治療剤を投与しても十分な効果が認められない場合／慢性心不全(軽症～中等症)。【用法】リシノプリル(無水物)として①成人1日1回10～20mg。重症高血圧症、腎障害を伴う高血圧症は5mgより開始が望ましい。6歳以上の小児1日1回0.07mg/kg。②ジギタリス製剤、利尿剤等の基礎治療剤と併用。成人1日1回5～10mg。腎障害を伴う患者は2.5mgより開始が望ましい。

2149i カルベジロール

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アーチスト錠1.25mg	1.25mg1錠	第一三共	17.30	先発・代表薬
後	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」	1.25mg1錠	沢井	9.90	H26.6.20収載
	アーチスト錠2.5mg	2.5mg1錠	第一三共	28.60	先発・代表薬
後	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	沢井	9.90	H26.6.20収載

【適応】次の状態でアンジオテンシン変換酵素阻害薬、利尿薬、ジギタリス製剤等の基礎治療を受けている患者／虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不全。【用法】1回1.25mg、1日2回食後から開始。忍容性がある場合、1週間以上の間隔で段階的に増量、ない場合は減量。増減は1回1.25mg、2.5mg、5mg、10mgのいずれかとする。維持量1回2.5～10mg、1日2回食後。年齢・症状により開始用量はさらに低用量可。

2149i カンデサルタン シレキセチル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	備考
	プロブレス錠2	2mg1錠	武田	37.50	○	○	先発・代表薬
後	カンデサルタン錠2mg「あすか」	2mg1錠	あすか製薬＝武田	21.60	○	○	H26.6.20収載
	プロブレス錠4	4mg1錠	武田	69.80	○	○	先発・代表薬
後	カンデサルタン錠4mg「あすか」	4mg1錠	あすか製薬＝武田	41.90	○	○	H26.6.20収載
	プロブレス錠8	8mg1錠	武田	135.60	○	○	先発・代表薬
後	カンデサルタン錠8mg「あすか」	8mg1錠	あすか製薬＝武田	81.40	○	○	H26.6.20収載
	プロブレス錠12	12mg1錠	武田	208.50	○	—	先発・代表薬
後	カンデサルタン錠12mg「あすか」	12mg1錠	あすか製薬＝武田	103.20	○	—	H26.6.20収載

【適応】①高血圧症、腎実質性高血圧症。②次の状態でアンジオテンシン変換酵素阻害剤の投与が適切でない場合／慢性心不全(軽症～中等症)。⇒(12mg錠は②を除く)【用法】①1日1回4～8mg。必要により12mgまで増量。腎実質性高血圧症又は腎障害を伴う高血圧症の場合は、1日1回2mgより開始、必要により8mgまで増量。②1日1回4mgから開始。8mgまで増量可。

2149i ドキサゾシンメシル酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	カルデナリン錠0.5mg	0.5mg1錠	ファイザー	19.30	先発・代表薬
後	ドキサゾシン錠0.5mg「JG」	0.5mg1錠	長生堂＝日本ジェネリック	9.90	H26.6.20収載
	カルデナリン錠1mg	1mg1錠	ファイザー	31.30	先発・代表薬
後	ドキサゾシン錠1mg「JG」	1mg1錠	長生堂＝日本ジェネリック	13.00	H26.6.20収載
	カルデナリン錠2mg	2mg1錠	ファイザー	56.60	先発・代表薬
後	ドキサゾシン錠2mg「JG」	2mg1錠	長生堂＝日本ジェネリック	22.60	H26.6.20収載
	カルデナリン錠4mg	4mg1錠	ファイザー	107.00	先発・代表薬
後	ドキサゾシン錠4mg「JG」	4mg1錠	長生堂＝日本ジェネリック	49.70	H26.6.20収載

【適応】高血圧症。褐色細胞腫による高血圧症。【用法】1日1回0.5mgより開始。効果不十分時は、1～2週間の間隔をおき1～4mgに漸増、1日1回。1日最高8mg。褐色細胞腫による高血圧症には1日最高16mg。

2149i バルサルタン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ディオバン錠20mg	20mg1錠	ノバルティス	32.30	先発・代表薬
後	バルサルタン錠20mg「AA」	20mg1錠	あすかアクタビス＝あすか製薬＝武田	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「DK」	20mg1錠	大興	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「DSEP」	20mg1錠	第一三共エスファ	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「EE」	20mg1錠	エルメッドエーザイ	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「FFP」	20mg1錠	富士フィルムファーマ	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「JG」	20mg1錠	日本ジェネリック	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「KN」	20mg1錠	小林化工	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「KOG」	20mg1錠	興和＝興和ジェネリック	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「SN」	20mg1錠	シオノ＝摩耶堂	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「TCK」	20mg1錠	辰巳	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「YD」	20mg1錠	陽進堂	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「ZE」	20mg1錠	全星	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「アメル」	20mg1錠	共和薬品	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「イセイ」	20mg1錠	イセイ	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「オーハラ」	20mg1錠	大原＝エッセンシャル	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「科研」	20mg1錠	タイト＝科研	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「杏林」	20mg1錠	キョーリンリメディオ＝杏林	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「ケミファ」	20mg1錠	ケミファ＝日本薬工	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「サノフィ」	20mg1錠	日本薬工＝サノフィ	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「サワイ」	20mg1錠	沢井	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「サンド」	20mg1錠	サンド	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「タカタ」	20mg1錠	高田	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「タナベ」	20mg1錠	田辺三菱＝田辺販売	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「ツルハラ」	20mg1錠	鶴原	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「トーフ」	20mg1錠	東和薬品	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「日医工」	20mg1錠	日医工	15.70	H26.6.20収載

(つづく)

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

(バルサルタンのつづき)

後	バルサルタン錠20mg「日新」	20mg1錠	日新製薬	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「ニプロ」	20mg1錠	ニプロ	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「ファイザー」	20mg1錠	ファイザー	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「明治」	20mg1錠	MeijiSeika	15.70	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠20mg「モチダ」	20mg1錠	持田	15.70	H26.6.20収載
後	ディオバンOD錠20mg	20mg1錠	ノバルティス	32.30	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	バルサルタンOD錠20mg「トーワ」	20mg1錠	東和薬品	15.70	H26.6.20収載／口腔崩壊錠
後	ディオバン錠40mg	40mg1錠	ノバルティス	58.50	先発・代表薬
後	バルサルタン錠40mg「AA」	40mg1錠	あすかアクタビス＝あすか製薬＝武田	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「DK」	40mg1錠	大興	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「DSEP」	40mg1錠	第一三共エスファ	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「EE」	40mg1錠	エルメッドエーザイ	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「FFP」	40mg1錠	富士フィルムファーマ	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「JG」	40mg1錠	日本ジェネリック	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「KN」	40mg1錠	小林化工	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「KOG」	40mg1錠	興和＝興和ジェネリック	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「SN」	40mg1錠	シオノ＝摩耶堂	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「TCK」	40mg1錠	辰巳	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「YD」	40mg1錠	陽進堂	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「ZE」	40mg1錠	全星	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「アメル」	40mg1錠	共和薬品	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「イセイ」	40mg1錠	イセイ	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「オーハラ」	40mg1錠	大原＝エッセンシャル	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「科研」	40mg1錠	タイト＝科研	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「杏林」	40mg1錠	キョーリンリメディオ＝杏林	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「ケミファ」	40mg1錠	ケミファ＝日本薬工	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「サノフィ」	40mg1錠	日本薬工＝サノフィ	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「サワイ」	40mg1錠	沢井	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「サンド」	40mg1錠	サンド	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「タカタ」	40mg1錠	高田	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「タナベ」	40mg1錠	田辺三菱＝田辺販売	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「ツルハラ」	40mg1錠	鶴原	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「トーワ」	40mg1錠	東和薬品	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「日医工」	40mg1錠	日医工	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「日新」	40mg1錠	日新製薬	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「ニプロ」	40mg1錠	ニプロ	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「ファイザー」	40mg1錠	ファイザー	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「明治」	40mg1錠	MeijiSeika	29.30	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠40mg「モチダ」	40mg1錠	持田	29.30	H26.6.20収載
後	ディオバンOD錠40mg	40mg1錠	ノバルティス	58.50	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	40mg1錠	東和薬品	29.30	H26.6.20収載／口腔崩壊錠
後	ディオバン錠80mg	80mg1錠	ノバルティス	109.10	先発・代表薬
後	バルサルタン錠80mg「AA」	80mg1錠	あすかアクタビス＝あすか製薬＝武田	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「DK」	80mg1錠	大興	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「DSEP」	80mg1錠	第一三共エスファ	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「EE」	80mg1錠	エルメッドエーザイ	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「FFP」	80mg1錠	富士フィルムファーマ	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「JG」	80mg1錠	日本ジェネリック	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「KN」	80mg1錠	小林化工	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「KOG」	80mg1錠	興和＝興和ジェネリック	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「SN」	80mg1錠	シオノ＝摩耶堂	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「TCK」	80mg1錠	辰巳	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「YD」	80mg1錠	陽進堂	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「ZE」	80mg1錠	全星	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「アメル」	80mg1錠	共和薬品	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「イセイ」	80mg1錠	イセイ	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「オーハラ」	80mg1錠	大原＝エッセンシャル	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「科研」	80mg1錠	タイト＝科研	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「杏林」	80mg1錠	キョーリンリメディオ＝杏林	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「ケミファ」	80mg1錠	ケミファ＝日本薬工	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「サノフィ」	80mg1錠	日本薬工＝サノフィ	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「サワイ」	80mg1錠	沢井	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「サンド」	80mg1錠	サンド	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「タカタ」	80mg1錠	高田	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「タナベ」	80mg1錠	田辺三菱＝田辺販売	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「ツルハラ」	80mg1錠	鶴原	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「トーワ」	80mg1錠	東和薬品	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「日医工」	80mg1錠	日医工	54.60	H26.6.20収載

(つづく)

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

(バルサルタンのつづき)

後	バルサルタン錠80mg「日新」	80mg1錠	日新製薬	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「ニプロ」	80mg1錠	ニプロ	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「ファイザー」	80mg1錠	ファイザー	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「明治」	80mg1錠	MeijiSeika	54.60	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠80mg「モチダ」	80mg1錠	持田	54.60	H26.6.20収載
後	ディオバンOD錠80mg	80mg1錠	ノバルティス	109.10	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	80mg1錠	東和薬品	54.60	H26.6.20収載／口腔崩壊錠
後	ディオバン錠160mg	160mg1錠	ノバルティス	212.60	先発・代表薬
後	バルサルタン錠160mg「AA」	160mg1錠	あすかアクタビス＝あすか製薬＝武田	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「DK」	160mg1錠	大興	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「DSEP」	160mg1錠	第一三共エスファ	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「EE」	160mg1錠	エルメッドエーザイ	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「FFP」	160mg1錠	富士フィルムファーマ	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「JG」	160mg1錠	日本ジェネリック	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「KN」	160mg1錠	小林化工	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「KOG」	160mg1錠	興和＝興和ジェネリック	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「SN」	160mg1錠	シオノ＝摩耶堂	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「TCK」	160mg1錠	辰巳	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「YD」	160mg1錠	陽進堂	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「ZE」	160mg1錠	全星	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「アメル」	160mg1錠	共和薬品	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「イセイ」	160mg1錠	イセイ	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「オーハラ」	160mg1錠	大原＝エッセンシャル	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「科研」	160mg1錠	タイト＝科研	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「杏林」	160mg1錠	キョーリンリメディオ＝杏林	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「ケミファ」	160mg1錠	ケミファ＝日本薬工	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「サノフィ」	160mg1錠	日本薬工＝サノフィ	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「サワイ」	160mg1錠	沢井	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「サンド」	160mg1錠	サンド	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「タカタ」	160mg1錠	高田	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「タナベ」	160mg1錠	田辺三菱＝田辺販売	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「ツルハラ」	160mg1錠	鶴原	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「トーワ」	160mg1錠	東和薬品	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「日医工」	160mg1錠	日医工	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「日新」	160mg1錠	日新製薬	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「ニプロ」	160mg1錠	ニプロ	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「ファイザー」	160mg1錠	ファイザー	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「明治」	160mg1錠	MeijiSeika	81.90	H26.6.20収載
後	バルサルタン錠160mg「モチダ」	160mg1錠	持田	81.90	H26.6.20収載
後	ディオバンOD錠160mg	160mg1錠	ノバルティス	212.60	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	バルサルタンOD錠160mg「トーワ」	160mg1錠	東和薬品	81.90	H26.6.20収載／口腔崩壊錠

【適応】高血圧症。【用法】〔成人〕1日1回40～80mg。1日160mgまで増量可。〔6歳以上の小児〕1日1回、体重35kg未満は20mg、35kg以上は40mg。体重35kg未満の1日最高量40mg。

2149i マニジピン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
後	カルスロット錠5	5mg1錠	武田	22.70	先発・代表薬
後	マニジピン塩酸塩錠5mg「JG」	5mg1錠	長生堂＝日本ジェネリック	9.90	H26.6.20収載
後	マニジピン塩酸塩錠5mg「サワイ」	5mg1錠	沢井	9.90	H26.6.20収載
後	カルスロット錠10	10mg1錠	武田	34.00	先発・代表薬
後	マニジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」	10mg1錠	沢井	17.30	H26.6.20収載
後	マニジピン塩酸塩錠10mg「JG」	10mg1錠	長生堂＝日本ジェネリック	13.20	H26.6.20収載
後	カルスロット錠20	20mg1錠	武田	66.90	先発・代表薬
後	マニジピン塩酸塩錠20mg「JG」	20mg1錠	長生堂＝日本ジェネリック	25.60	H26.6.20収載
後	マニジピン塩酸塩錠20mg「サワイ」	20mg1錠	沢井	25.60	H26.6.20収載

【適応】高血圧症。【用法】1回10～20mg、1日1回、朝食後。1日5mgから開始、必要に応じ漸増。

2149i メトプロロール酒石酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
後	セロケン錠20mg	20mg1錠	アストラゼネカ	15.00	先発・代表薬
後	ロブレゾール錠20mg	20mg1錠	ノバルティス	15.00	先発・代表薬
後	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「JG」	20mg1錠	長生堂＝日本ジェネリック	7.30	H26.6.20収載

【適応】①本態性高血圧症(軽症～中等症)。②狭心症、頻脈性不整脈。【用法】①1日60～120mg、分3。効果不十分時は240mgまで増量可。②1日60～120mg、分2～3。

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

2149T ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	プレミネト配合錠LD	1錠	MSD	139.70	先発・代表薬
後	ロサルヒド配合錠LD「AA」	1錠	あすかアクタビス=あすか製薬=武田	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「DK」	1錠	大興	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「EE」	1錠	エルメッドエーザイ	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「EP」	1錠	ニプロバッチ=第一三共エスファ	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「FFP」	1錠	富士フィルムファーマ	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「JG」	1錠	日本ジェネリック	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「KN」	1錠	小林化工	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「KO」	1錠	寿	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「KOG」	1錠	興和=興和ジェネリック	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「SN」	1錠	シオノ	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「TCK」	1錠	辰巳	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「YD」	1錠	陽進堂	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「アメル」	1錠	共和薬品	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「科研」	1錠	タイト=科研	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「杏林」	1錠	キョーリンリメディオ=杏林	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「ケミファ」	1錠	ケミファ=日本薬工	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「サワイ」	1錠	沢井	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「サンド」	1錠	サンド	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「三和」	1錠	三和化学	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「タカタ」	1錠	高田	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「タナベ」	1錠	田辺三菱=田辺販売	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「ツルハラ」	1錠	鶴原	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「トーフ」	1錠	東和薬品	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「日医工」	1錠	日医工	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「日新」	1錠	日新製薬	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「ニプロ」	1錠	ニプロ	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「ファイザー」	1錠	ファイザー	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「明治」	1錠	MeijiSeika	69.90	H26.6.20収載
後	ロサルヒド配合錠LD「モチダ」	1錠	持田	69.90	H26.6.20収載

【適応】高血圧症。【用法】1日1回1錠。高血圧治療の第一選択薬としての使用不可。

2160B ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
後	ジヒデルゴット錠1mg	1mg1錠	ノバルティス	15.40	先発・代表薬/本品目も後発指定あり
後	ヒポラル錠1mg	1mg1錠	あすか製薬=武田	15.40	先発・代表薬//
後	ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩錠1mg「イセイ」	1mg1錠	イセイ	5.60	H26.6.20収載

【適応】起立性低血圧、片頭痛(血管性頭痛)。【用法】1回1mg、1日3回。

2160i ミドドリン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	メトリジン錠2mg	2mg1錠	大正製薬=大正富山	44.20	先発・代表薬
後	ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	2mg1錠	沢井	16.80	H26.6.20収載

【適応】本態性低血圧、起立性低血圧。【用法】成人・小児とも1日4mg、分2。重症の場合、成人1日8mgまで増量可。小児の1日最高量6mg。

2171 アムロジピンベシル酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	備考
	ノルバスクOD錠2.5mg	2.5mg1錠	ファイザー	29.90	○	△	先発・代表薬/口腔崩壊錠
	アムロジンOD錠2.5mg	2.5mg1錠	大日本住友	29.00	○	△	先発・代表薬//
後	アムロジピンOD錠2.5mg「イセイ」	2.5mg1錠	イセイ	17.40	○	△	H26.6.20収載/口腔崩壊錠
	ノルバスクOD錠5mg	5mg1錠	ファイザー	54.50	○	△	先発・代表薬/口腔崩壊錠
	アムロジンOD錠5mg	5mg1錠	大日本住友	53.30	○	△	先発・代表薬//
後	アムロジピンOD錠5mg「イセイ」	5mg1錠	イセイ	32.20	○	△	H26.6.20収載/口腔崩壊錠
	ノルバスクOD錠10mg	10mg1錠	ファイザー	82.80	△	△	先発・代表薬/口腔崩壊錠
	アムロジンOD錠10mg	10mg1錠	大日本住友	81.60	△	△	先発・代表薬//
後	アムロジピンOD錠10mg「イセイ」	10mg1錠	イセイ	49.20	△	△	H26.6.20収載/口腔崩壊錠

【適応】①高血圧症。②狭心症。【用法】①成人1日1回2.5~5mg。効果不十分時は1日1回10mgまで増量可。(以下、10mg製剤を除く)6歳以上の小児1日1回2.5mg。②成人1日1回5mg。 ※△は小児用法がないことを示す。

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

2171 一硝酸イソソルビド

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アイトロール錠10mg	10mg1錠	トーアエイヨー＝アステラス	10.00	先発・代表薬
後	一硝酸イソソルビド錠10mg「トーフ」	10mg1錠	東和薬品	5.60	H26.6.20収載
	アイトロール錠20mg	20mg1錠	トーアエイヨー＝アステラス	15.70	先発・代表薬
後	一硝酸イソソルビド錠20mg「トーフ」	20mg1錠	東和薬品	7.60	H26.6.20収載

【適応】狭心症。【用法】1回20mg, 1日2回。効果不十分時は, 1回40mg, 1日2回も可。労作狭心症・労作兼安静狭心症で重症と判断された場合, 1回40mg, 1日2回も可。

2171 ニフェジピン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アダラートL錠10mg	10mg1錠	バイエル	17.30	先発・代表薬
後	ニフェジピン錠10mg「三和」	10mg1錠	三和化学	5.60	H26.6.20収載
	アダラートL錠20mg	20mg1錠	バイエル	29.60	先発・代表薬
後	ニフェジピン錠20mg「三和」	20mg1錠	三和化学	10.70	H26.6.20収載

【適応】①狭心症。②本態性高血圧症, 腎性高血圧症。【用法】①1回20mg, 1日2回。②1回10～20mg, 1日2回。

2189i アトルバスタチンカルシウム水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	リピートル錠10mg	10mg1錠	アステラス	107.90	先発・代表薬
後	アトルバスタチン錠20mg「日医工」	20mg1錠	日医工	69.80	H26.6.20収載／先発・代表薬に同一規格なし

【適応】高コレステロール血症。家族性高コレステロール血症。【用法】1日1回10mg。重症の場合, 高コレステロール血症は1日20mgまで, 家族性高コレステロール血症は1日40mgまで増量可。

2189i ピタバスタチンカルシウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	備考
	リバロ錠4mg	4mg1錠	興和＝興和創薬	229.40	○	先発・代表薬
後	ピタバスタチンCa錠4mg「科研」	4mg1錠	ダイト＝科研	118.00	△	H26.6.20収載
後	ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KO」	4mg1錠	寿	118.00	△	H26.6.20収載
後	ピタバスタチンカルシウム錠4mg「モチダ」	4mg1錠	持田	118.00	△	H26.6.20収載

【適応】①高コレステロール血症, 家族性高コレステロール血症。【用法】①1日1回1～2mg(ピタバスタチンCa錠4mg「科研」, ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KO」「モチダ」は夕食後)。LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合, 1日4mgまで増量可。※△は用法が一部異なることを示す。

2190i トコフェロールニコチン酸エステル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ユベランソフトカプセル200mg	200mg1カプセル	エーザイ	10.70	先発・代表薬
後	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」	200mg1カプセル	日医工	5.60	H26.6.20収載

【適応】高脂質血症。高血圧症に伴う随伴症状。閉塞性動脈硬化症に伴う末梢循環障害。【用法】1日300～600mg, 分3。

2224 ペントキシベリンクエン酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	トクレスパンスールカプセル30mg	30mg1カプセル	大日本住友	11.30	先発・代表薬
後	ペントキシベリンクエン酸塩錠30mg「JG」	30mg1錠	長生堂＝日本ジェネリック	5.40	H26.6.20収載／先発・代表薬に同一剤形なし

【適応】次の疾患に伴う咳嗽／感冒, 喘息性(様)気管支炎, 気管支喘息, 急性気管支炎, 慢性気管支炎, 肺結核, 上気道炎(咽喉頭炎, 鼻カタル)。【用法】〔徐放カプセル〕1日60～120mg, 分2～3。〔錠〕1日15～120mg, 分2～3。

2239i アンブロキシール塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ムコサール-Lカプセル45mg	45mg1カプセル	日本ベーリンガー	67.70	先発・代表薬
	ムコソルバンLカプセル45mg	45mg1カプセル	帝人ファーマ	67.70	先発・代表薬
後	アンブロキシール塩酸塩徐放カプセル45mg「ZE」	45mg1カプセル	全星＝科研	38.60	H26.6.20収載
後	アンブロキシール塩酸塩徐放カプセル45mg「日医工」	45mg1カプセル	日医工＝日本薬工	38.60	H26.6.20収載
後	アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」	45mg1錠	全星＝三和化学	38.60	H26.6.20収載／先発・代表薬に同一剤形なし
後	アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	45mg1錠	沢井	31.50	H26.6.20収載／〃
後	アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」	45mg1錠	ニプロ	31.50	H26.6.20収載／〃
	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0.3%1mL	帝人ファーマ	11.20	先発・代表薬
後	アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「TCK」	0.3%1mL	辰巳	5.10	H26.6.20収載

【適応】〔徐放剤〕次の疾患の去痰／急性気管支炎, 気管支喘息, 慢性気管支炎, 気管支拡張症, 肺結核, 塵肺症, 手術後の喀痰喀出困難。〔シロップ〕次の疾患の去痰／急性気管支炎, 気管支喘息。【用法】〔徐放剤〕1日1回45mg。〔シロップ〕幼・小児1日0.9mg(シロップ:0.3mL)／kg, 分3。

2259i トリメチノール塩酸塩水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	イノリンシロップ0.1%	0.1%1mL	田辺三菱	8.80	先発・代表薬
後	トリメチノール塩酸塩シロップ小児用0.1%「TCK」	0.1%1mL	辰巳	3.90	H26.6.20収載

【適応】次の疾患の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解／気管支炎、喘息様気管支炎、気管支喘息。【用法】製剤として1日、1歳未満1～2mL、1～3歳未満2～4mL、3～5歳未満4～6mL、分3～4。

2325 シメチジン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	カイロック細粒40%	40%1g	藤本	20.90	先発・代表薬
後	シメチジン細粒40%「トーワ」	40%1g	東和薬品	7.50	H26.6.20収載

【適応】①胃潰瘍、十二指腸潰瘍。②吻合部潰瘍、Zollinger-Ellison症候群、逆流性食道炎、上部消化管出血(消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による)。③次の疾患の胃粘膜病変(びらん、出血、発赤、浮腫)の改善／急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期。【用法】①1日800mg(細粒:2g)、分2朝食後及び就寝前。分4毎食後及び就寝前又は1日1回就寝前可。②1日800mg、分2朝食後及び就寝前。分4毎食後及び就寝前可。③1日400mg(細粒:1g)、分2朝食後及び就寝前。1日1回就寝前可。

2325 ニザチジン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	③	備考
	アシノン錠75mg	75mg1錠	ゼリア	23.20	○	○	○	先発・代表薬
後	ニザチジンカプセル75mg「サワイ」	75mg1カプセル	沢井	16.50	○	○	○	H26.6.20収載／先発・代表薬に同一剤形なし
	アシノン錠150mg	150mg1錠	ゼリア	36.90	○	○	—	先発・代表薬
後	ニザチジンカプセル150mg「サワイ」	150mg1カプセル	沢井	25.30	○	○	—	H26.6.20収載／先発・代表薬に同一剤形なし

【適応】①胃潰瘍、十二指腸潰瘍。②逆流性食道炎。③次の疾患の胃粘膜病変(びらん、出血、発赤、浮腫)の改善／急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期。⇒(③は75mg製剤のみ)【用法】①1回150mg、1日2回朝食後、就寝前。1日1回300mg、就寝前可。②1回150mg、1日2回朝食後、就寝前。③1回75mg、1日2回朝食後、就寝前。

2325 ファモチジン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ガスター散2%	2%1g	アステラス	54.70	先発・代表薬
後	ファモチジン散2%「杏林」	2%1g	キョーリンリメディオ＝杏林	21.90	H26.6.20収載
	ガスター散10%	10%1g	アステラス	233.70	先発・代表薬
後	ファモチジン散10%「杏林」	10%1g	キョーリンリメディオ＝杏林	89.80	H26.6.20収載

【適応】①胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍。上部消化管出血(消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による)、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison症候群。②次の疾患の胃粘膜病変(びらん、出血、発赤、浮腫)の改善／急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期。【用法】①1回20mg(2%散:1g、10%散:0.2g)、1日2回朝食後、夕食後又は就寝前。1日1回40mg(2%散:2g、10%散:0.4g)、就寝前可。②1回10mg(2%散:0.5g、10%散:0.1g)、1日2回朝食後、夕食後又は就寝前。1日1回20mg、就寝前可。

2325 ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アルタットカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル	あすか製薬＝武田	25.90	○ ○ ○ ○ 先発・代表薬
後	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル37.5mg「サワイ」	37.5mg1カプセル	沢井	15.00	△ △ △ △ H26.6.20収載
	アルタットカプセル75mg	75mg1カプセル	あすか製薬＝武田	42.20	○ ○ ○ ○ 先発・代表薬
後	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「サワイ」	75mg1カプセル	沢井	23.90	△ △ △ △ H26.6.20収載

【適応】①胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎。②Zollinger-Ellison症候群。③麻酔前投薬。④次の疾患の胃粘膜病変(びらん、出血、発赤、浮腫)の改善／急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期。【用法】(以下、小児用法はアルタットのみ)①成人・体重30kg以上の小児1回75mg、体重30kg未満の小児1回37.5mg、1日2回、朝食後、就寝前又は夕食後。成人は1日1回150mg、就寝前可。②成人・体重30kg以上の小児1回75mg、体重30kg未満の小児1回37.5mg、1日2回、朝食後、就寝前又は夕食後。③成人・体重30kg以上の小児1回75mg、体重30kg未満の小児1回37.5mg、手術前日就寝前及び手術当日麻酔導入2時間前、2回。成人は1回150mg、手術前日就寝前可。④成人・体重30kg以上の小児1日1回75mg、体重30kg未満の小児1日1回37.5mg、就寝前又は夕食後。 ※△は小児用法がないことを示す。

2329i アルジオキサ

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
後	アランタSP細粒20%	20%1g	キッセイ	6.20	先発・代表薬
後	イサロン顆粒25%	25%1g	あすか製薬＝武田	10.20	先発・代表薬
後	アルジオキサ顆粒10%「トーワ」	10%1g	東和薬品	5.60	H26.6.20収載／先発・代表薬に同一規格なし
後	アランタSF錠100mg	100mg1錠	キッセイ	5.60	先発・代表薬／本品目も後発指定あり
後	イサロン錠100mg	100mg1錠	あすか製薬＝武田	5.60	先発・代表薬／本品目も後発指定あり
後	アルジオキサ錠100mg「トーワ」	100mg1錠	東和薬品	5.60	H26.6.20収載

【適応】次の疾患における自覚症状・他覚所見の改善／胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎。【用法】1日300～400mg(10%顆粒:3～4g、20%細粒:1.5～2g、25%顆粒:1.2～1.6g)、分3～4。

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

2329i ソファルコン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ソロン細粒20%	20%1g	大正製薬＝大正富山	26.20	先発・代表薬
後	ソファルコン細粒20%「JG」	20%1g	長生堂＝日本ジェネリック	14.20	H26.6.20収載
後	ソファルコン細粒20%「トーワ」	20%1g	東和薬品	14.20	H26.6.20収載
後	ソファルコン細粒10%「トーワ」	10%1g	東和薬品	9.00	H26.6.20収載／先発・代表薬に同一規格なし

【適応】次の疾患の胃粘膜病変(びらん, 出血, 発赤, 浮腫)の改善/急性胃炎, 慢性胃炎の急性増悪期。胃潰瘍。【用法】1回100mg(10%細粒: 1g, 20%細粒: 0.5g), 1日3回。

2329i ランソプラゾール

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	③	④	備考
	タケブロンOD錠15	15mg1錠	武田	89.30	○	○	○	○	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」	15mg1錠	テバ製薬＝カイゲンファーマ	34.80	○	○	○	－	H26.6.20収載／口腔崩壊錠
	タケブロンOD錠30	30mg1錠	武田	155.70	○	○	－	－	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	ランソプラゾールOD錠30mg「テバ」	30mg1錠	テバ製薬＝カイゲンファーマ	61.80	○	○	－	－	H26.6.20収載／口腔崩壊錠

【適応】①胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 吻合部潰瘍, Zollinger-Ellison症候群。逆流性食道炎。②次におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助/胃潰瘍, 十二指腸潰瘍, 胃MALTリンパ腫, 特発性血小板減少性紫斑病, 早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃, ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎。③非びらん性胃食道逆流症。④低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制, 非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制。⇒(③は15mg製剤のみ, ④はタケブロンOD錠15のみ)【用法】①[逆流性食道炎]1日1回30mg, 8週間まで。再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法は1日1回15mg(効果不十分時は30mg)まで。[その他]1日1回30mg。胃潰瘍・吻合部潰瘍は8週間まで。十二指腸潰瘍は6週間まで。②1回30mg, アモキシシリン水和物1回750mg, クラリスロマイシン1回200mgの3剤を同時に1日2回, 7日間。クラリスロマイシンは1回400mg, 1日2回まで増量可。プロトンポンプインヒビター, アモキシシリン水和物, クラリスロマイシンの3剤による除菌治療が不成功の場合は代替治療として, 1回30mg, アモキシシリン水和物1回750mg, メトロニダゾール1回250mgの3剤を同時に1日2回, 7日間。③1日1回15mg。4週間まで。④1日1回15mg。

2344 酸化マグネシウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
後	マグラックス錠250mg	250mg1錠	吉田製薬	5.60	先発・代表薬/本品目も後発指定あり
後	酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」	250mg1錠	健栄	5.60	H26.6.20収載
後	マグラックス錠330mg	330mg1錠	吉田製薬	5.60	先発・代表薬/本品目も後発指定あり
後	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	330mg1錠	健栄	5.60	H26.6.20収載
後	マグラックス錠500mg	500mg1錠	吉田製薬	5.60	先発・代表薬/本品目も後発指定あり
後	酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」	500mg1錠	健栄	5.60	H26.6.20収載

【適応】①次の疾患における制酸作用と症状の改善/胃・十二指腸潰瘍, 胃炎(急・慢性胃炎, 薬剤性胃炎を含む), 上部消化管機能異常(神経性食思不振, いわゆる胃下垂症, 胃酸過多症を含む)。②便秘症。③尿路シュウ酸カルシウム結石の発生予防。【用法】①1日0.5~1g(細粒: 0.6~1.2g), 分数回。②1日2g(同2.4g), 分3食前又は食後。あるいは就寝前1回。③1日0.2~0.6g(同0.24~0.72g)。

2354 センノシド

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	プルゼニド錠12mg	12mg1錠	ノバルティス	5.60	先発・代表薬
後	センノシド錠12mg「ツルハラ」	12mg1錠	鶴原	5.00	H26.6.20収載

【適応】便秘症。【用法】1日1回12~24mg, 就寝前。高度の便秘には1回48mgまで増量可。

2359i ピコスルファートナトリウム水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	③	④	備考
	ラキソベロン錠2.5mg	2.5mg1錠	帝人ファーマ	9.20	○	○	—	—	先発・代表薬
後	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	沢井	5.60	○	○	—	—	H26.6.20 収載
後	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「ツルハラ」	2.5mg1錠	鶴原	5.60	○	○	—	—	H26.6.20 収載
	ラキソベロン内用液0.75%	0.75%1mL	帝人ファーマ	26.00	○	○	○	○	先発・代表薬
後	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーフ」	0.75%1mL	東和薬品	10.50	○	○	○	○	H26.6.20 収載
後	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「ツルハラ」	0.75%1mL	鶴原	10.50	○	○	○	○	H26.6.20 収載

【適応】①各種便秘症。②術後排便補助。造影剤(硫酸バリウム)投与後の排便促進。③手術前における腸管内容物の排除。④大腸検査(X線・内視鏡)前処置における腸管内容物の排除。⇒(錠は①②のみ)【用法】【錠】①成人1日1回5.0～7.5mg, 7～15歳5.0mg。②術後排便補助は成人1日1回5.0～7.5mg, 排便促進は成人3.0～7.5mg。【液】製剤として①成人1日1回10～15滴, 14～7歳10滴, 6～4歳7滴, 3～1歳6滴, 1歳未満～7ヶ月3滴, 7ヶ月未満2滴。②術後排便補助は成人1日1回10～15滴, 排便促進は成人6～15滴。③成人14滴。④検査予定時間の10～15時間前に成人20mL。

2399i ドンペリドン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ナウゼリン錠5	5mg1錠	協和発酵キリン	10.50	先発・代表薬
後	ドンペリドン錠5mg「ツルハラ」	5mg1錠	鶴原	5.80	H26.6.20収載
後	ドンペリドン錠5mg「アメル」	5mg1錠	共和薬品	5.60	H26.6.20収載
後	ドンペリドン錠5mg「サワイ」	5mg1錠	沢井	5.60	H26.6.20収載
	ナウゼリン錠10	10mg1錠	協和発酵キリン	16.30	先発・代表薬
後	ドンペリドン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	沢井	5.80	H26.6.20収載
	ナウゼリンドライシロップ1%	1%1g	協和発酵キリン	38.40	先発・代表薬
後	ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	1%1g	沢井	12.00	H26.6.20収載

【適応】【錠】次の疾患・薬剤投与時の消化器症状(悪心, 嘔吐, 食欲不振, 腹部膨満, 上腹部不快感, 腹痛, 胸やけ, げっぷ)／成人:慢性胃炎, 胃下垂症, 胃切除後症候群, 抗悪性腫瘍剤・レボドパ製剤投与時, 小児:周期性嘔吐症, 上気道感染症, 抗悪性腫瘍剤投与時。【DS】小児の次の疾患・薬剤投与時の消化器症状(悪心, 嘔吐, 食欲不振, 腹部膨満, 腹痛)／周期性嘔吐症, 乳幼児下痢症, 上気道感染症, 抗悪性腫瘍剤投与時。【用法】成人:1回10mg, 1日3回食前。レボドパ製剤投与時には1回5～10mg, 1日3回食前。小児:1日1～2mg/kg, 分3食前。1日30mgまで。6歳以上は1日最高量1mg/kg。

2491 カリジノゲナーゼ

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	カルナクリン錠25	25単位1錠	三和化学	12.60	先発・代表薬
	サークレチンS錠25	25単位1錠	あすか製薬＝武田	12.20	先発・代表薬
後	カリジノゲナーゼ錠25単位「サワイ」	25単位1錠	東菱＝沢井	5.60	H26.6.20収載
後	カリジノゲナーゼ錠25単位「ショーワ」	25単位1錠	昭和薬化	5.60	H26.6.20収載

【適応】次の疾患における末梢循環障害の改善／高血圧症, メニエル症候群, 閉塞性血栓性血管炎(ビュルガー病)。次の症状の改善／更年期障害, 網脈絡膜の循環障害。【用法】1日30～150単位, 分3。

3222 クエン酸第一鉄ナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	フェロミア顆粒8.3%	1g	サンノーバ＝エーザイ	16.60	先発・代表薬
後	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	1g	鶴原	7.10	H26.6.20収載
	フェロミア錠50mg	鉄50mg1錠	サンノーバ＝エーザイ	9.90	先発・代表薬
後	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	鉄50mg1錠	沢井	5.60	H26.6.20収載
後	クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg「ツルハラ」	鉄50mg1錠	鶴原	5.60	H26.6.20収載

【適応】鉄欠乏性貧血。【用法】1日100～200mg(顆粒:1.2～2.4g), 分1～2。

3399i イコサペント酸エチル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	エバデールカプセル300	300mg1カプセル	持田	42.20	先発・代表薬
後	イコサペント酸エチルカプセル300mg「フソー」	300mg1カプセル	扶桑	25.50	H26.6.20収載
後	イコサペント酸エチルカプセル300mg「CH」	300mg1カプセル	長生堂＝日本ジェネリック	17.20	H26.6.20収載
後	イコサペント酸エチルカプセル300mg「H」	300mg1カプセル	原沢	17.20	H26.6.20収載

【適応】①閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍, 疼痛及び冷感の改善。②高脂血症。【用法】①1回600mg, 1日3回毎食直後。②1回600mg, 1日3回毎食直後。又は1回900mg, 1日2回毎食直後。トリグリセリドの異常を呈する場合には, その程度により1回900mg, 1日3回まで増量可。

3399i シロスタゾール

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	プレタールOD錠50mg	50mg1錠	大塚製薬	90.40	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	シロスタゾールOD錠50mg「KO」	50mg1錠	寿	57.40	H26.6.20収載／口腔崩壊錠
後	シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」	50mg1錠	日本薬工＝ケミファ＝富士フィルムファーマ	57.40	H26.6.20収載／
	プレタールOD錠100mg	100mg1錠	大塚製薬	161.90	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	シロスタゾールOD錠100mg「KO」	100mg1錠	寿	102.70	H26.6.20収載／口腔崩壊錠
後	シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」	100mg1錠	日本薬工＝ケミファ＝富士フィルムファーマ	102.70	H26.6.20収載／
後	シロスタゾールOD錠100mg「マイラン」	100mg1錠	マイラン＝ファイザー	53.50	H26.6.20収載／

【適応】①慢性動脈閉塞症に基づく潰瘍、疼痛・冷感等の虚血性諸症状の改善。②脳梗塞(心原性脳塞栓症を除く)発症後の再発抑制。【用法】1回100mg, 1日2回。

3399i ペラプロストナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ドルナー錠20μg	20μg1錠	東レ＝アステラス	61.80	先発・代表薬
	プロサイリン錠20	20μg1錠	科研	61.80	先発・代表薬
後	ペラプロストナトリウム錠20μg「JG」	20μg1錠	長生堂＝日本ジェネリック	35.10	H26.6.20収載

【適応】①慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍、疼痛及び冷感の改善。②原発性肺高血圧症。【用法】①1日120μg, 分3。②1日60μg, 分3より開始。症状(副作用)を観察しながら漸増。増量は投与回数1日3～4回, 1日最高180μg。

3399i リマプロスト アルファデクス

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	備考
	オパルモン錠5μg	5μg1錠	小野	69.30	○	○	先発・代表薬
	プロレナール錠5μg	5μg1錠	大日本住友	61.70	○	○	先発・代表薬
後	リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」	5μg1錠	シオノ＝ケミファ＝原沢＝東和薬品	37.20	○	○	H26.6.20収載
後	リマプロストアルファデクス錠5μg「テバ」	5μg1錠	テバ製薬	37.20	○	○	H26.6.20収載
後	リマプロストアルファデクス錠10μg「テバ」	10μg1錠	テバ製薬	82.80	○	—	H26.6.20収載／先発・代表薬に同一規格なし

【適応】①閉塞性血管炎に伴う潰瘍、疼痛・冷感等の虚血性諸症状の改善。②後天性の腰部脊柱管狭窄症(SLR試験正常で両側性の間欠跛行を呈する患者)に伴う自覚症状(下肢疼痛、下肢しびれ)及び歩行能力の改善。⇒(10μg錠は①のみ)【用法】①1日30μg, 分3。②1日15μg, 分3。

3949i ベンズプロマロン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ユリノーム錠25mg	25mg1錠	鳥居	15.10	先発・代表薬
後	ベンズプロマロン錠25mg「アメル」	25mg1錠	共和薬品	5.80	H26.6.20収載
後	ベンズプロマロン錠25mg「トーワ」	25mg1錠	東和薬品	5.80	H26.6.20収載

【適応】①痛風における高尿酸血症の改善。②高尿酸血症を伴う高血圧症における高尿酸血症の改善。【用法】①1日1回25～50mg。維持量1回50mg, 1日1～3回。②1回50mg, 1日1～3回。

3961 グリベンクラミド

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	オイグルコン錠1.25mg	1.25mg1錠	中外	7.70	先発・代表薬
	ダオニール錠1.25mg	1.25mg1錠	サノフィ	7.70	先発・代表薬
後	グリベンクラミド錠1.25mg「JG」	1.25mg1錠	長生堂＝日本ジェネリック	5.60	H26.6.20収載
後	グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	1.25mg1錠	三和化学	5.60	H26.6.20収載
	オイグルコン錠2.5mg	2.5mg1錠	中外	13.30	先発・代表薬
	ダオニール錠2.5mg	2.5mg1錠	サノフィ	13.30	先発・代表薬
後	グリベンクラミド錠2.5mg「JG」	2.5mg1錠	長生堂＝日本ジェネリック	5.60	H26.6.20収載
後	グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	2.5mg1錠	三和化学	5.60	H26.6.20収載

【適応】インスリン非依存型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合)。【用法】1日1.25～2.5mg, 適宜増量し維持量決定。1日最高量10mg。1日1回投与は朝食前又は後, 1日2回投与は朝夕食前又は後。

3961 グリメピリド

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アマリールOD錠0.5mg	0.5mg1錠	サノフィ	10.90	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」	0.5mg1錠	東和薬品	9.60	H26.6.20収載／口腔崩壊錠
	アマリールOD錠1mg	1mg1錠	サノフィ	18.60	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	1mg1錠	東和薬品	10.50	H26.6.20収載／口腔崩壊錠
	アマリールOD錠3mg	3mg1錠	サノフィ	43.40	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	グリメピリドOD錠3mg「トーワ」	3mg1錠	東和薬品	25.30	H26.6.20収載／口腔崩壊錠

【適応】2型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合)。【用法】1日0.5～1mgより開始, 1日1～2回朝又は朝夕, 食前又は食後。維持量1日1～4mg, 1日最高6mg。

3962 メトホルミン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	グリコラン錠250mg	250mg1錠	日本新薬	9.60	先発・代表薬
後	メトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」	250mg1錠	シオノケミファ=テバ製薬	9.60	H26.6.20収載

【適応】次のいずれかの治療で効果不十分な場合の2型糖尿病/食事療法・運動療法のみ、食事療法・運動療法に加えてSU剤を使用。【用法】1日500mgより開始、分2～3。1日最高量750mg。

3969i ボグリボース

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	備考
	ベイスン錠0.2	0.2mg1錠	武田	38.20	○	○	先発・代表薬
後	ボグリボース錠0.2mg「JG」	0.2mg1錠	長生堂=日本ジェネリック	16.60	○	○	H26.6.20収載
	ベイスン錠0.3	0.3mg1錠	武田	51.90	○	—	先発・代表薬
後	ボグリボース錠0.3mg「JG」	0.3mg1錠	長生堂=日本ジェネリック	23.50	○	—	H26.6.20収載

【適応】①糖尿病の食後過血糖の改善(食事療法・運動療法で十分な効果が得られない場合、又は両療法に加え、経口血糖降下剤、もしくはインスリン製剤の投与で十分な効果が得られない場合)。②耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制(ただし、食事療法・運動療法を十分に行っても改善されない場合)。⇒(②は0.3mg製剤を除く)【用法】①1回0.2mg、1日3回毎食直前。効果不十分時は1回0.3mgまで増量可。②1回0.2mg、1日3回毎食直前。

3999i アレンドロン酸ナトリウム水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	フォサマック錠5	5mg1錠	MSD	100.90	先発・代表薬
	ボナロン錠5mg	5mg1錠	帝人ファーマ	100.90	先発・代表薬
後	アレンドロン酸錠5mg「テバ」	5mg1錠	テバ製薬	58.70	H26.6.20収載
後	アレンドロン酸錠5mg「ファイザー」	5mg1錠	マイラン=ファイザー	45.90	H26.6.20収載
	フォサマック錠35mg	35mg1錠	MSD	646.50	先発・代表薬
	ボナロン錠35mg	35mg1錠	帝人ファーマ	646.50	先発・代表薬
後	アレンドロン酸錠35mg「テバ」	35mg1錠	テバ製薬	362.40	H26.6.20収載
後	アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	35mg1錠	マイラン=ファイザー	314.70	H26.6.20収載

【適応】骨粗鬆症。【用法】アレンドロン酸として[5mg錠]1日1回5mg、毎朝起床時。[35mg錠]35mgを1週間に1回、朝起床時。以上、水約180mLとともに投与。

3999i エバルレスタット

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	キネダック錠50mg	50mg1錠	小野	121.70	先発・代表薬
後	エバルレスタット錠50mg「ケミファ」	50mg1錠	メディサ=ケミファ	64.60	H26.6.20収載

【適応】次の症状(糖化ヘモグロビンが高値を示す場合)の改善/糖尿病性末梢神経障害に伴う自覚症状(しびれ感、疼痛)、振動覚異常、心拍変動異常。【用法】1回50mg、1日3回食前。

3999i シクロスポリン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ネオール10mgカプセル	10mg1カプセル	ノバルティス	119.30	先発・代表薬
後	シクロスポリンカプセル10mg「ファイザー」	10mg1カプセル	マイラン=ファイザー	84.40	H26.6.20収載
	ネオール25mgカプセル	25mg1カプセル	ノバルティス	252.20	先発・代表薬
後	シクロスポリンカプセル25mg「ファイザー」	25mg1カプセル	マイラン=ファイザー=ポーラファルマ	150.70	H26.6.20収載
	ネオール50mgカプセル	50mg1カプセル	ノバルティス	438.00	先発・代表薬
後	シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」	50mg1カプセル	マイラン=ファイザー=ポーラファルマ	266.10	H26.6.20収載
後	シクロスポリン細粒17%「ファイザー」	17%1g	マイラン=ファイザー	902.60	H26.6.20収載/先発・代表薬に同一剤形なし

【適応】①腎移植における拒絶反応の抑制。②骨髄移植における拒絶反応・移植片対宿主病の抑制。③ベーチェット病(眼症状のある場合)、及びその他の非感染性ぶどう膜炎(既存治療で効果不十分であり、視力低下のおそれのある活動性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎に限る)。④肝移植における拒絶反応の抑制。⑤心・肺・脾移植における拒絶反応の抑制。⑥小腸移植における拒絶反応の抑制。⑦尋常性乾癬(皮疹が全身の30%以上に及ぶもの又は難治性の場合)、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬。⑧再生不良性貧血(重症)、赤芽球癆。⑨ネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはステロイドに抵抗性を示す場合)。⑩全身型重症筋無力症(胸腺摘出後の治療において、ステロイド剤の投与が効果不十分、又は副作用により困難な場合)。⑪アトピー性皮膚炎(既存治療で十分な効果が得られない患者)。【用法】①移植1日前から1日9～12mg/kg。以後1日2mg/kgずつ減量。維持量1日4～6mg/kg。②移植1日前から1日6～12mg/kg。3～6ヶ月間継続、漸減し中止。③1日5mg/kg。以後1ヶ月ごとに1日1～2mg/kgずつ減量又は増量。維持量1日3～5mg/kg。以上、1日量を分2。④移植1日前から1日14～16mg/kg。分2。以後漸減し、維持量1日5～10mg/kg。⑤移植1日前から1日10～15mg/kg。分2。以後漸減し、維持量1日2～6mg/kg。⑥1日14～16mg/kg。分2。以後漸減し、維持量1日5～10mg/kg。⑦1日5mg/kg。分2。効果がみられたら1ヶ月ごとに1日1mg/kgずつ減量、維持量1日3mg/kg。⑧1日6mg/kg。分2。⑨頻回再発型には成人1日1.5mg/kg、小児1日2.5mg/kg。分2。ステロイドに抵抗性を示す症例には成人1日3mg/kg、小児1日5mg/kg。分2。⑩1日5mg/kg。分2。効果がみられたら漸減、維持量3mg/kg。⑪成人1日3mg/kg。分2。1日5mg/kgを超えない。

4291 イマチニブメシル酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	③	④	備考
	グリベック錠100mg	100mg1錠	ノバルティス	2,617.40	○	○	○	○	先発・代表薬
後	イマチニブ錠100mg「DSEP」	100mg1錠	第一三共エスファ	1,540.30	—	—	○	—	H26.6.20 収載
後	イマチニブ錠100mg「NSKK」	100mg1錠	エール薬品＝日本新薬	1,540.30	—	—	○	—	H26.6.20 収載
後	イマチニブ錠100mg「ニプロ」	100mg1錠	ニプロ	1,540.30	—	—	○	—	H26.6.20 収載
後	イマチニブ錠100mg「明治」	100mg1錠	MeijiSeika	1,540.30	—	—	○	—	H26.6.20 収載
後	イマチニブ錠200mg「ニプロ」	200mg1錠	ニプロ	2,953.20	—	—	○	—	H26.6.20 収載／ 先発・代 表薬に同 一規格な し
後	イマチニブ錠200mg「明治」	200mg1錠	MeijiSeika	2,953.20	—	—	○	—	H26.6.20 収載／ 先発・代 表薬に同 一規格な し

【適応】①慢性骨髄性白血病。②KIT(CD117)陽性消化管間質腫瘍。③フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病。④FIP1L1-PDGFR α 陽性の次の疾患／好酸球増多症候群，慢性好酸球性白血病。⇒(①②④はグリベックのみ)【用法】①〔慢性期〕1日1回400mg。1日1回600mgまで増量可。〔移行期・急性期〕1日1回600mg。1回400mg，1日2回まで増量可。②1日1回400mg。③1日1回600mg。④1日1回100mg。1日1回400mgまで増量可。

4291 ビカルタミド

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	カソデックス錠80mg	80mg1錠	アストラゼネカ	910.40	先発・代表薬
後	ビカルタミド錠80mg「テバ」	80mg1錠	テバ製薬	398.10	H26.6.20収載

【適応】前立腺癌。【用法】1日1回，80mg。

4291 フルタミド

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	オダイン錠125mg	125mg1錠	日本化薬	292.90	先発・代表薬
後	フルタミド錠125mg「ファイザー」	125mg1錠	マイラン＝ファイザー＝ 日本ジェネリック	170.30	H26.6.20収載

【適応】前立腺癌。【用法】1回125mg，1日3回。

4413 メキタジン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ゼスラン錠3mg	3mg1錠	旭化成ファーマ	8.20	先発・代表薬
	ニボラジン錠3mg	3mg1錠	アルフレッサファーマ	8.20	先発・代表薬
後	メキタジン錠3mg「TCK」	3mg1錠	辰巳	5.60	H26.6.20収載

【適応】①じんま疹。皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症)。アレルギー性鼻炎。②気管支喘息。【用法】①1回3mg，1日2回。②1回6mg，1日2回。

4490 オロバタジン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	備考
	アレロックOD錠2.5	2.5mg1錠	協和発酵キリン	44.70	○	○	先発・代表薬／口腔 崩壊錠
後	オロバタジン塩酸塩OD錠2.5mg「トー	2.5mg1錠	東和薬品	24.00	△	△	H26.6.20収載／口腔 崩壊錠
	アレロックOD錠5	5mg1錠	協和発酵キリン	56.80	○	○	先発・代表薬／口腔 崩壊錠
後	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	5mg1錠	東和薬品	30.50	△	△	H26.6.20収載／口腔 崩壊錠

【適応】〔成人〕アレルギー性鼻炎，じんま疹，皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎，痒疹，皮膚そう痒症，尋常性乾癬，多形滲出性紅斑)。〔小児〕アレルギー性鼻炎，じんま疹，皮膚疾患(湿疹・皮膚炎，皮膚そう痒症)に伴うそう痒。⇒(アレロックのみ小児・成人に適応有，その他は成人のみ)【用法】〔成人〕1回5mg，1日2回朝・就寝前。〔小児〕7歳以上1回5mg，1日2回朝・就寝前。 ※△は小児用法がないことを示す。

4490 セチリジン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	備考
	ジルテック錠5	5mg1錠	UCB=GSK=第一三共	82.50	○	○	先発・代表薬
後	セチリジン塩酸塩錠5mg「ファイザー」	5mg1錠	マイラン=ファイザー	31.90	○	○	H26.6.20収載
	ジルテック錠10	10mg1錠	UCB=GSK=第一三共	102.30	△	△	先発・代表薬
後	セチリジン塩酸塩錠10mg「ファイザー」	10mg1錠	マイラン=ファイザー	46.20	△	△	H26.6.20収載

【適応】〔成人〕アレルギー性鼻炎。じんま疹、湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症。〔小児〕アレルギー性鼻炎。じんま疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒。⇒(10mg錠は成人のみ、その他は小児・成人に適応有)【用法】〔成人〕1日1回10mg、就寝前。1日最高量20mg。〔小児〕7～15歳未満1回5mg、1日2回朝食後・就寝前。 ※△は小児用法がないことを示す。

4490 フェキソフェナジン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考	備考
	アレグラ錠30mg	30mg1錠	サノフィ	56.40	○	先発・代表薬
後	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ツルハ」	30mg1錠	鶴原	24.30	○	H26.6.20収載
後	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「EJ」	30mg1錠	エルメッドエーザイ	31.90	○	H26.6.20収載／口腔崩壊錠
後	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「KN」	30mg1錠	小林化工	31.90	○	H26.6.20収載／
	アレグラ錠60mg	60mg1錠	サノフィ	71.90	○	先発・代表薬
後	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ツルハラ」	60mg1錠	鶴原	31.10	○	H26.6.20収載
	アレグラOD錠60mg	60mg1錠	サノフィ	71.90	○	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「YD」	60mg1錠	陽進堂=日本ジェネリック	41.40	○	H26.6.20収載／口腔崩壊錠
	アレグラドライシロップ5%	5%1g	サノフィ	130.90	○*	先発・代表薬
後	フェキソフェナジン塩酸塩DS6%「タカタ」	6%1g	高田	67.90	○	H26.6.20収載／先発・代表薬に同一規格なし

【適応】アレルギー性鼻炎、じんま疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎)に伴うそう痒。【用法】成人・12歳以上の小児1回60mg(5%DS:1.2g、6%DS:1g)、7～12歳未満の小児1回30mg(5%DS:0.6g、6%DS:0.5g)、1日2回。(以下アレグラDSのみ)2～7歳未満1回30mg、6ヶ月～2歳未満1回15mg(5%DS:0.3g)、1日2回。 ※○*は用法が一部異なることを示す。

4490 プランルカスト水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	オノンカプセル112.5mg	112.5mg1カプセル	小野	58.80	先発・代表薬
後	プランルカストカプセル225mg「日医工」	225mg1カプセル	日医工	60.00	H26.6.20収載／先発・代表薬に同一規格なし

【適応】気管支喘息。アレルギー性鼻炎。【用法】1日450mg、分2。

4490 ロラタジン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	クラリチン錠10mg	10mg1錠	MSD=塩野義	94.50	先発・代表薬
後	ロラタジン錠10mg「CH」	10mg1錠	長生堂=日本ジェネリック	53.40	H26.6.20収載
	クラリチンレディタブ錠10mg	10mg1錠	MSD=塩野義	94.50	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	ロラタジンOD錠10mg「CH」	10mg1錠	長生堂=日本ジェネリック	53.40	H26.6.20収載／口腔崩壊錠
	クラリチンドライシロップ1%	1%1g	MSD=塩野義	197.10	先発・代表薬
後	ロラタジンDS1%「JG」	1%1g	長生堂=日本ジェネリック	118.50	H26.6.20収載

【適応】アレルギー性鼻炎、じんま疹、皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒。【用法】成人・7歳以上の小児1日1回10mg(DS:1g)。3～7歳未満の小児(DSのみ)1日1回5mg(同0.5g)。

6132 セファクロル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ケフラル細粒小児用100mg	100mg1g	塩野義	43.50	先発・代表薬
後	セファクロル細粒小児用10%「JG」	100mg1g	長生堂=日本ジェネリック	16.20	H26.6.20収載
後	セファクロル細粒小児用10%「サワイ」	100mg1g	沢井	16.20	H26.6.20収載
	ケフラルカプセル250mg	250mg1カプセル	塩野義	53.70	先発・代表薬
後	セファクロルカプセル250mg「SN」	250mg1カプセル	シオノ=摩耶堂=昭和薬化	28.20	H26.6.20収載
後	セファクロルカプセル250mg「JG」	250mg1カプセル	長生堂=日本ジェネリック	22.60	H26.6.20収載
後	セファクロルカプセル250mg「サワイ」	250mg1カプセル	沢井	22.60	H26.6.20収載

【適応】<適応菌種>本剤感性的のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌。<適応症>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷・手術創等の二次感染、乳腺炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、麦粒腫、中耳炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎、猩紅熱。【用法】〔細粒〕幼小児1日20～40mg/kg、分3。〔カプセル〕成人・体重20kg以上の小児1日750mg、分3。重症・分離菌の感受性が比較的低い症例には1日1.500mg、分3。

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

6132 セフボドキシム プロキセチル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	備考
	パナン錠100mg	100mg1錠	第一三共=GSK	75.90	○*	先発・代表薬
後	セフボドキシムプロキセチル錠100mg「サワイ」	100mg1錠	沢井	43.30	○*	H26.6.20収載
	パナンドライシロップ5%	50mg1g	第一三共=GSK	74.00	○***	先発・代表薬
後	セフボドキシムプロキセチルDS小児用5%「サワイ」	50mg1g	沢井	44.60	○***	H26.6.20収載

【適応】<適応菌種>セフボドキシム感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、◇淋菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、◇ペプトストレプトコッカス属。(DSは◇を除く)<適応症>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎。⇒[錠のみ]乳腺炎、肛門周囲膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、尿道炎、バルトリン腺炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎。⇒[DSのみ]猩紅熱。【用法】[錠]1回100mg、1日2回。重症・効果不十分時は1回200mg、1日2回食後。[DS]幼小児1回3mg(DS:0.06g)/kg、1日2~3回。重症・効果不十分時は1回4.5mg(同0.09g)/kg、1日3回。※○*, ○***は適応菌種・適応症が一部異なることを示す。

6149i アジスロマイシン水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	備考
	ジスロマック細粒小児用10%	100mg1g	ファイザー	299.50	-	○	先発・代表薬
後	アジスロマイシン細粒小児用10%「TCK」	100mg1g	辰巳	194.10	-	○	H26.6.20収載
	ジスロマック錠250mg	250mg1錠	ファイザー	264.40	○	-	先発・代表薬
後	アジスロマイシン錠250mg「TCK」	250mg1錠	辰巳	146.30	△	-	H26.6.20収載
	ジスロマックカプセル小児用100mg	100mg1カプセル	ファイザー	205.20	-	○	先発・代表薬
後	アジスロマイシンカプセル小児用100mg「TCK」	100mg1カプセル	辰巳	133.50	-	○	H26.6.20収載

【適応】①[250mg錠]<適応菌種>アジスロマイシン感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、インフルエンザ菌、レジオネラ・ニューモフィラ、ペプトストレプトコッカス属、クラミジア属、マイコプラズマ属。⇒(ジスロマック錠250mgのみ)淋菌、プレボテラ属。<適応症>深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、尿道炎、子宮頸管炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎。⇒(ジスロマック錠250mgのみ)骨盤内炎症性疾患。②[小児用細粒・カプセル]<適応菌種>アジスロマイシン感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、インフルエンザ菌、肺炎クラミジア(クラミジア・ニューモニエ)、マイコプラズマ属。<適応症>咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、中耳炎。【用法】アジスロマイシンとして①[250mg錠]1日1回500mg、3日間。尿道炎・子宮頸管炎は1000mg、1回。骨盤内炎症性疾患はアジスロマイシン注射剤による治療後、1日1回250mg。②[小児用細粒・カプセル]小児1日1回10mg/kg、3日間。体重別1日量、15~25kg:200mg、26~35kg:300mg、36~45kg:400mg、46kg~:500mg。1日量は成人の最大量500mgまで。15kg未満の患児には細粒投与。※△は適応菌種・適応症が一部異なることを示す。

6149i ロキシスロマイシン

	商品名	規格単位	会社名	薬価		備考
	ルリッド錠150	150mg1錠	サノフィ	69.00		先発・代表薬
後	ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	150mg1錠	沢井	29.90		H26.6.20収載
後	ロキシスロマイシン錠150mg「日医工」	150mg1錠	日医工	29.90		H26.6.20収載

【適応】<適応菌種>本剤感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、アクネ菌、肺炎マイコプラズマ(マイコプラズマ・ニューモニエ)。<適応症>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡(化膿性炎症を伴うもの)、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎。【用法】1日300mg、分2。

6219i サラゾスルファピリジン

	商品名	規格単位	会社名	薬価		備考
	アザルフィジンEN錠250mg	250mg1錠	ファイザー=参天	38.70		先発・代表薬
後	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「SN」	250mg1錠	シオノ=原沢	17.00		H26.6.20収載
	アザルフィジンEN錠500mg	500mg1錠	ファイザー=参天	65.60		先発・代表薬
後	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「SN」	500mg1錠	シオノ=東和薬品=テバ製薬	27.40		H26.6.20収載

【適応】関節リウマチ。【用法】消炎鎮痛剤等で効果不十分時に使用。1日1g、分2朝食後。

6241 塩酸シプロフロキサシン

	商品名	規格単位	会社名	薬価		備考
	シプロキサシン錠100mg	100mg1錠	バイエル	53.10		先発・代表薬
後	シプロフロキサシン錠100mg「SW」	100mg1錠	沢井	23.90		H26.6.20収載
	シプロキサシン錠200mg	200mg1錠	バイエル	93.60		先発・代表薬
後	シプロフロキサシン錠200mg「SW」	200mg1錠	沢井=旭化成ファーマ	37.20		H26.6.20収載

【適応】<適応菌種>シプロフロキサシン感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、炭疽菌、大腸菌、赤痢菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、緑膿菌、アシネトバクター属、レジオネラ属、ペプトストレプトコッカス属。<適応症>①表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷・手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、精巣上体炎(副睾丸炎)、尿道炎、胆のう炎、胆管炎、感染性腸炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙のう炎、麦粒腫、瞼板腺炎、中耳炎、副鼻腔炎。②炭疽。【用法】①1回100~200mg、1日2~3回。②1回400mg、1日2回。

6250i アシクロビル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ゾビラックス顆粒40%	40%1g	GSK	370.70	先発・代表薬
後	アシクロビル顆粒40%「タカタ」	40%1g	高田	135.30	H26.6.20収載
後	アシクロビルシロップ8%「タカタ」	8%1mL	高田	35.60	H26.6.20収載／先発・代表薬に同一剤形なし

【適応】①単純疱疹。②造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症(単純疱疹)の発症抑制。③帯状疱疹。④水痘。⑤性器ヘルペスの再発抑制。【用法】①成人1回200mg, 1日5回。小児1回20mg/kg, 1日4回。小児は1回最高200mg。②成人1回200mgを1日5回, 小児1回20mg/kgを1日4回, 骨髄移植施行7日前より施行後35日まで。小児は1回最高200mg。③成人1回800mg, 1日5回。小児1回20mg/kg, 1日4回。小児は1回最高800mg。④小児1回20mg/kg, 1日4回。1回最高800mg。⑤小児1回20mg/kg, 1日4回。1回最高200mg。

6290i フルコナゾール

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ジフルカンカプセル50mg	50mg1カプセル	ファイザー	554.10	先発・代表薬
後	フルコナゾールカプセル50mg「日医工」	50mg1カプセル	日医工	221.90	H26.6.20収載
	ジフルカンカプセル100mg	100mg1カプセル	ファイザー	918.20	先発・代表薬
後	フルコナゾールカプセル100mg「日医工」	100mg1カプセル	日医工	498.60	H26.6.20収載

【適応】①カンジダ属, クリプトコッカス属による次の感染症／真菌血症, 呼吸器真菌症, 消化管真菌症, 尿路真菌症, 真菌髄膜炎。②造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防。【用法】①成人1日1回, カンジダ症には50～100mg, クリプトコッカス症には50～200mg。小児1日1回, カンジダ症には3mg/kg, クリプトコッカス症には3～6mg/kg。重症又は難治性真菌感染症には成人1日400mgまで, 小児1日12mg/kgまで増量可。②1日1回, 成人400mg, 小児12mg/kg。以上, いずれも生後14日までの新生児は小児と同量を72時間ごと, 生後15日以降の新生児は小児と同量を48時間ごと。小児は1日400mgまで。

以 上

薬効・薬価リスト平成26年版 追補情報(平成26年6月)

II. ジェネリック(後発医薬品)とそれに対応する先発・代表薬一覧表(外用薬)

平成26年6月20日告示品目における診療報酬上の後発医薬品と、それに対応する先発・代表薬をまとめています(平成26年7月4日現在、入手できた情報による)。

薬効分類・成分名別に掲載しています。

商品名の左に「後」とあるものが、診療報酬上の後発医薬品です。

背景色が、先発・代表薬を指します(便宜的に後発医薬品等を選択している場合があります)。

成分内において、適応や用法に違いがあり、かつ簡便に記号で分類できる場合、薬価欄の右に対応する番号とともに表記しました。記号は

○: 適応ないし用法あり

△: 適応ないし用法を持つが、一部に違いあり

—: 適応・用法なし

を使用しています。これらはあくまで簡便な分類ですので、各成分別表記末尾の適応・用法表記とあわせてご覧ください。また一覧は対象品目を抜粋したもので、必ずしも同成分の品目全てに当てはまりません。さらに、作成時の情報から更新・変更されている場合がありますので、処方・調剤にあたっては必ず最新の添付文書をご確認ください。

1141 アセトアミノフェン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アルピニー坐剤200	200mg1個	久光	30.00	先発・代表薬
	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg1個	アボット	30.00	先発・代表薬
	カロナール坐剤200	200mg1個	昭和薬化=高田	30.00	先発・代表薬
後	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	200mg1個	日新製薬	19.90	H26.6.20収載

【適応】小児科領域における解熱・鎮痛。【用法】乳児・幼児・小児1回10～15mg/kg。投与間隔4～6時間以上、1日総量60mg/kgまで。ただし成人量を超えない。

1147 ジクロフェナクナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ボルタレンサボ12.5mg	12.5mg1個	ノバルティス	44.30	先発・代表薬
後	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「CH」	12.5mg1個	長生堂=日本ジェネリック	19.30	H26.6.20収載
後	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	12.5mg1個	日医工	19.30	H26.6.20収載
	ボルタレンサボ25mg	25mg1個	ノバルティス	51.40	先発・代表薬
後	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「CH」	25mg1個	長生堂=日本ジェネリック	19.90	H26.6.20収載
後	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	25mg1個	日医工	19.90	H26.6.20収載
	ボルタレンサボ50mg	50mg1個	ノバルティス	63.10	先発・代表薬
後	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	50mg1個	日医工	27.50	H26.6.20収載

【適応】次の疾患・症状の鎮痛・消炎/関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、後陣痛、手術後。急性上気道炎(急性気管炎を伴う急性上気道炎を含む)の緊急解熱(他の解熱剤では効果が期待できないか、他の解熱剤の投与が不可能な場合)。【用法】成人1回25～50mg、小児1回0.5～1mg/kg(1～3歳未満:6.25mg, 3～6歳未満:6.25～12.5mg, 6～9歳未満:12.5mg, 9～12歳未満:12.5～25mg), 1日1～2回。小児・高齢者は少量から投与開始。

1319i ノルフロキサシン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ノフロ点眼液0.3%	0.3%1mL	日医工	114.00	先発・代表薬
	バクシダール点眼液0.3%	0.3%1mL	杏林=千寿=武田	114.00	先発・代表薬
後	ノルフロキサシン点眼液0.3%「NikPJ」	0.3%1mL	日医工ファーマ=日医工	42.30	H26.6.20収載

【適応】<適応菌種>本剤感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、マイクロコッカス属、モラクセラ属、コリネバクテリウム属、バシラス属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、インフルエンザ菌、ヘモフィルス・エジプチウス(コッホ・ウィークス菌)、シュードモナス属、緑膿菌、バークホルデリア・セバシア、ステントロホモナス(ザントモナス)・マルトフィリア、アシネトバクター属、フラボバクテリウム属、アルカリゲネス属。<適応症>眼瞼炎、涙のう炎、麦粒腫、結膜炎、瞼板腺炎、角膜炎(角膜潰瘍を含む)、眼科周術期の無菌化療法。【用法】1回1滴、1日3回。

1319J トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ミドリnP点眼液	1mL	参天	29.90	先発・代表薬
後	ミドレフリンP点眼液	1mL	日東メディック	24.60	H26.6.20収載

【適応】診断・治療を目的とする散瞳・調節麻痺。【用法】[散瞳]1回1～2滴又は1回1滴を3～5分おきに2回。[調節麻痺]1回1滴、3～5分おきに2～3回。

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

2233 アセチルシステイン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ムコフィリン吸入液20%	17.62%2mL1包	サンノーバ=エーザイ	62.90	先発・代表薬
後	アセチルシステインNa塩注入・吸入用液20W/V%「ショーワ」	17.62%2mL1管	昭和薬化	50.10	HH26.6.20収載／先発・代表薬に同一規格なし

【適応】次の疾患の去痰／気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核、肺気腫、上気道炎(咽頭炎、喉頭炎)、肺化膿症、肺炎、嚢胞性線維症、術後肺合併症。次における前後処置／気管支造影、気管支鏡検査、肺癌細胞診、気管切開術。【用法】1回1～4mL、単独又は他の薬剤を混じて気管内に直接注入又は噴霧吸入。

2260i ポビドンヨード

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	イソジンガーグル液7%	7%1mL	MeijiSeika	3.30	先発・代表薬
後	ポビドンヨードガーグル7%「ショーワ」	7%1mL	昭和薬化	2.40	H26.6.20収載

【適応】咽頭炎、扁桃炎、口内炎、拔牙創を含む口腔創傷の感染予防、口腔内の消毒。【用法】2～4mLを約60mLの水に希釈し、1日数回含嗽。

2399i ドンペリドン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ナウゼリン坐剤10	10mg1個	協和発酵キリン	61.90	先発・代表薬
後	ドンペリドン坐剤10mg「JG」	10mg1個	長生堂=日本ジェネリック	34.30	H26.6.20収載
後	ドンペリドン坐剤10mg「日新」	10mg1個	日新製薬	34.30	H26.6.20収載
	ナウゼリン坐剤30	30mg1個	協和発酵キリン	102.30	先発・代表薬
後	ドンペリドン坐剤30mg「日新」	30mg1個	日新製薬	58.90	H26.6.20収載
後	ドンペリドン坐剤30mg「JG」	30mg1個	長生堂=日本ジェネリック	47.50	H26.6.20収載

【適応】小児の次の疾患・薬剤投与時の消化器症状(悪心、嘔吐、食欲不振、腹部膨満、腹痛)／周期性嘔吐症、乳幼児下痢症、上気道感染症、抗悪性腫瘍剤投与時。【用法】3歳未満1回10mg、3歳以上1回30mg、1日2～3回。

2529i オキシコナゾール硝酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	オキナゾール錠100mg	100mg1錠	田辺三菱	61.10	先発・代表薬
後	オキシコナゾール硝酸塩錠100mg「F」	100mg1錠	富士製薬	48.70	H26.6.20収載
	オキナゾール錠600mg	600mg1錠	田辺三菱	331.50	先発・代表薬
後	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	600mg1錠	富士製薬	256.00	H26.6.20収載

【適応】カンジダに起因する膣炎、外陰膣炎。【用法】[100mg]1日1回1錠、6日間継続。効果が得られない場合さらに1日1回1錠を6日間継続。[600mg]1週1回1錠。効果が得られない場合さらに1回1錠。

2612 ポビドンヨード

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	イソジン液10%	10%10mL	MeijiSeika	27.80	先発・代表薬
後	ポビドンヨード外用液10%「日新」	10%10mL	日新製薬	14.70	H26.6.20収載

【適応】各種消毒。【用法】適量使用等。

2634 ゲンタマイシン硫酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg1g	MSD	13.20	先発・代表薬
後	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	1mg1g	岩城	8.20	H26.6.20収載

【適応】<適応菌種>ゲンタマイシン感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属(肺炎球菌を除く)、大腸菌、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンス属、緑膿菌。<適応症>表在性皮膚感染症、慢性膿皮症、びらん・潰瘍の二次感染。【用法】1日1～数回、塗布又は貼付。

2649A ヘパリン類似物質

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ヒルドイドゲル0.3%	1g	マルホ	14.30	先発・代表薬
後	ヘパリン類似物質ゲル0.3%「テバ」	1g	大正薬品=テバ製薬	6.50	H26.6.20収載

【適応】外傷(打撲、捻挫、挫傷)後の腫脹・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎、血栓性静脈炎、血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患(注射後の硬結・疼痛)、凍瘡、肥厚性癬痕・ケロイドの治療と予防、進行性指掌角皮症、筋性斜頸(乳児期)。【用法】1日1～数回、塗擦、貼付。

2649i インドメタシン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	カトレップパップ70mg	10cm×14cm1枚	帝國製薬	25.40	先発・代表薬
後	インドメタシンパップ70mg「BMD」	10cm×14cm1枚	バイオメディクス=ファイザー	19.30	H26.6.20収載

【適応】次の疾患・症状の鎮痛・消炎／変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎(テニス肘等)、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛。【用法】1日2回、貼付。

2649i ケトプロフェン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	モーラステープ20mg	7cm×10cm1枚	久光＝祐徳	28.40	先発・代表薬
後	ケトプロフェンテープ20mg「BMD」	7cm×10cm1枚	ピオメディクス＝持田	12.80	H26.6.20収載
	モーラステープL40mg	10cm×14cm1枚	久光＝祐徳	43.70	先発・代表薬
後	ケトプロフェンテープ40mg「BMD」	10cm×14cm1枚	ピオメディクス＝持田	18.10	H26.6.20収載

【適応】関節リウマチにおける関節局所の鎮痛。次の疾患・症状の鎮痛・消炎／腰痛症(筋・筋膜性腰痛症, 変形性脊椎症, 椎間板症, 腰椎捻挫), 変形性関節症, 肩関節周囲炎, 腱・腱鞘炎, 腱周囲炎, 上腕骨上顆炎(テニス肘等), 筋肉痛, 外傷後の腫脹・疼痛。【用法】1日1回, 貼付。

2649i ジクロフェナクナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ナポールパップ140mg	10cm×14cm1枚	久光	29.80	先発・代表薬
後	ジクロフェナクNaパップ280mg「ラクール」	20cm×14cm1枚	三友＝ラクール	33.40	H26.6.20収載／先発・代表薬に同一規格なし

【適応】次の疾患・症状の鎮痛・消炎／変形性関節症, 肩関節周囲炎, 腱・腱鞘炎, 腱周囲炎, 上腕骨上顆炎(テニス肘等), 筋肉痛(筋・筋膜性腰痛症等), 外傷後の腫脹・疼痛。【用法】1日1回, 貼付。

2649i ロキソプロフェンナトリウム水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ロキソニンテープ50mg	7cm×10cm1枚	リードケミカル＝第一三共	27.00	先発・代表薬
後	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三友」	7cm×10cm1枚	三友＝ラクール	15.50	H26.6.20収載
	ロキソニンテープ100mg	10cm×14cm1枚	リードケミカル＝第一三共	41.50	先発・代表薬
後	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三友」	10cm×14cm1枚	三友＝ラクール	23.90	H26.6.20収載

【適応】次の疾患・症状の消炎・鎮痛／変形性関節症, 筋肉痛, 外傷後の腫脹・疼痛。【用法】1日1回, 貼付。

6250i ビダラビン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アラセナーA軟膏3%	3%1g	持田	325.40	先発・代表薬
後	ビダラビン軟膏3%「トーワ」	3%1g	東和薬品	125.40	H26.6.20収載

【適応】帯状疱疹, 単純疱疹。【用法】1日1～4回, 塗布, 貼布。

以 上

薬効・薬価リスト平成26年版 追補情報(平成26年6月)

III. ジェネリック(後発医薬品)とそれに対応する先発・代表薬一覧表(注射薬)

平成26年6月20日告示品目における診療報酬上の後発医薬品と、それに対応する先発・代表薬をまとめています(平成26年7月4日現在、入手できた情報による)。
 薬効分類・成分名別に掲載しています。
 商品名の左に「後」とあるものが、診療報酬上の後発医薬品です。
 背景 ■色が、先発・代表薬を指します(便宜的に後発医薬品等を選択している場合があります)。
 成分内において、適応や用法に違いがあり、かつ簡便に記号で分類できる場合、薬価欄の右に対応する番号とともに表記しました。記号は
 ○: 適応ないし用法あり
 △: 適応ないし用法を持つが、一部に違いあり
 -: 適応・用法なし
 を使用しています。これらはあくまで簡便な分類ですので、各成分別表記末尾の適応・用法表記とあわせてご覧ください。
 また一覧は対象品目を抜粋したもので、必ずしも同成分の品目全てに当てはまりません。さらに、作成時の情報から更新・変更されている場合がありますので、処方・調剤にあたっては必ず最新の添付文書をご確認ください。

1119i プロポフォール

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	1%ディプリバン注	200mg20mL1管	アストラゼネカ	1,232.00	先発・代表薬
後	プロポフォール静注1%20mL「FK」	200mg20mL1管	フレゼニウスK	844.00	H26.6.20収載
	1%ディプリバン注	500mg50mL1瓶	アストラゼネカ	1,830.00	先発・代表薬
後	プロポフォール静注1%50mL「FK」	500mg50mL1瓶	フレゼニウスK	890.00	H26.6.20収載
	1%ディプリバン注	1g100mL1瓶	アストラゼネカ	2,110.00	先発・代表薬
後	プロポフォール静注1%100mL「FK」	1g100mL1瓶	フレゼニウスK	1,003.00	H26.6.20収載

【適応】①全身麻酔の導入及び維持。②集中治療における人工呼吸中の鎮静。【用法】①[導入]0.5mg(0.05mL)/kg/10秒で、就眠が得られるまで静注。ASAIII及びIVの患者にはより緩徐に投与。通常2~2.5mg(0.20~0.25mL)/kgで就眠。以後、適宜追加。[維持]酸素又は酸素・亜酸化窒素混合ガスと併用し、静注。通常4~10mg(0.4~1.0mL)/kg/時。鎮痛剤(麻薬性鎮痛剤、局所麻酔剤等)併用。②0.3mg(0.03mL)/kg/時で、持続静注開始。通常0.3~3mg(0.03~0.3mL)/kg/時。必要により鎮痛剤併用。

1143 サリチル酸ナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
後	サルソニン静注0.5g	5%10mL1管	扶桑	58.00	先発・代表薬/本品目も後発指定あり
後	サリチル酸ナトリウム静注0.5g「日新」	5%10mL1管	日新製薬=日本ジェネリック	58.00	H26.6.20収載

【適応】症候性神経痛。【用法】1回0.5~1g(10~20mL)、1日1~数回静注。

1214 リドカイン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	③	④	備考
	キシロカイン注ポリアンプ0.5%	0.5%5mL1管	アストラゼネカ	60.00	○	○	○	-	先発・代表薬
後	リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」	0.5%5mL1管	日新製薬=富士フィルムファーマ	58.00	○	○	○	-	H26.6.20収載
	キシロカイン注ポリアンプ0.5%	0.5%10mL1管	アストラゼネカ	98.00	○	○	○	-	先発・代表薬
後	リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」	0.5%10mL1管	日新製薬=富士フィルムファーマ	68.00	○	○	○	-	H26.6.20収載
	キシロカイン注ポリアンプ1%	1%5mL1管	アストラゼネカ	60.00	○	○	○	○	先発・代表薬
後	リドカイン塩酸塩注1%「日新」	1%5mL1管	日新製薬=富士フィルムファーマ	58.00	○	○	○	○	H26.6.20収載
	キシロカイン注ポリアンプ1%	1%10mL1管	アストラゼネカ	102.00	○	○	○	○	先発・代表薬
後	リドカイン塩酸塩注1%「日新」	1%10mL1管	日新製薬=富士フィルムファーマ	85.00	○	○	○	○	H26.6.20収載
	キシロカイン注ポリアンプ2%	2%5mL1管	アストラゼネカ	81.00	○	○	○	○	先発・代表薬
後	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	2%5mL1管	日新製薬	58.00	○	○	○	○	H26.6.20収載
	キシロカイン注ポリアンプ2%	2%10mL1管	アストラゼネカ	147.00	○	○	○	○	先発・代表薬
後	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	2%10mL1管	日新製薬	117.00	○	○	○	○	H26.6.20収載

【適応】①硬膜外麻酔。②伝達麻酔。③浸潤麻酔。④表面麻酔。⇒(0.5%は④を除く)【用法】①0.5%:25~150mg(5~30mL)、交感神経遮断には25~100mg(5~20mL)。1%:100~200mg(10~20mL)。2%:200mg(10mL)。②0.5%:15~200mg(3~40mL)、指趾神経遮断には15~50mg(3~10mL)、肋間神経遮断には25mg(5mL)まで。1%:30~200mg(3~20mL)、指趾神経遮断には30~100mg(3~10mL)、肋間神経遮断には50mg(5mL)まで。2%:40~200mg(2~10mL)、指趾神経遮断には60~120mg(3~6mL)。③0.5%:10~200mg(2~40mL)。1%:20~200mg(2~20mL)。2%:40~200mg(2~10mL)。④1%・2%の適量を塗布又は噴霧。以上、基準最高用量1回200mg。

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

2171 ジピリダモール

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ペルサンチン静注10mg	0.5%2mL1管	日本ベーリンガー	61.00	先発・代表薬
後	ジピリダモール静注液10mg「日医工」	0.5%2mL1管	日医工	56.00	H26.6.20収載

【適応】狭心症、心筋梗塞、その他の虚血性心疾患、うつ血性心不全。【用法】1回10mg(1A)、1日1～3回徐々に静注。

2325 シメチジン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	タガメット注射液200mg	10%2mL1管	大日本住友	142.00	先発・代表薬
後	シメチジン注200mg「NP」	10%2mL1管	ニプロ	56.00	H26.6.20収載
後	シメチジン注射液200mg「トーワ」	10%2mL1管	東和薬品	56.00	H26.6.20収載

【適応】①上部消化管出血(消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による)。②侵襲ストレス(手術後に集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・重症熱傷等)による上部消化管出血の抑制。③麻酔前投薬。【用法】①②1回200mg、1日4回(6時間間隔)緩徐に静注。又は輸液に混合し点滴静注。②では術後集中管理又は集中治療を必要とする期間(手術侵襲ストレスは3日間程度、その他の侵襲ストレスは7日間程度)の投与。③1回200mg、麻酔導入1時間前に筋注。

2325 ファモチジン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	備考
	ガスター注射液10mg	10mg1mL1管	アステラス	157.00	○	○	先発・代表薬
後	ファモチジン静注10mg「杏林」	10mg10mL1管	キョーリンリメディオ＝杏林	95.00	△	△	H26.6.20収載／先発・代表薬に同一規格なし
後	ファモチジン静注20mg「杏林」	20mg20mL1管	キョーリンリメディオ＝杏林	137.00	△	△	H26.6.20収載／先発・代表薬に同一規格なし

【適応】①上部消化管出血(消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による)、Zollinger-Ellison症候群、侵襲ストレス(手術後集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷)による上部消化管出血の抑制。②麻酔前投薬。【用法】①1回20mg、1日2回(12時間ごと)緩徐に静注。又は点滴静注。又は1回20mg、1日2回(12時間ごと)筋注。侵襲ストレスによる上部消化管出血抑制は、術後集中管理又は集中治療を必要とする期間(手術侵襲ストレス3日程度、その他の侵襲ストレス7日程度)の投与。②1回20mg、麻酔導入1時間前に筋注。又は緩徐に静注。(①②とも筋注はファモチジン静注「杏林」を除く) ※△は用法に筋注がないことを示す。

2391 グラニセトロン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	カイトリル注1mg	1mg1mL1管	中外	1,780.00	先発・代表薬
後	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」	1mg50mL1袋	光	1,362.00	H26.6.20収載／先発・代表薬に同一規格なし

【適応】次の場合に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)／①抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与、②放射線照射。【用法】①成人・小児とも1日1回40μg/kg、静注又は点滴静注(小児への投与、バッグ品は点滴静注のみ)。症状が改善されない場合、40μg/kg1回追加投与可。②成人1回40μg/kg、点滴静注。1日2回投与まで。

3136 メコバラミン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	メチコバル注射液500μg	0.5mg1管	エーザイ	116.00	先発・代表薬
後	メコバラミン注射液500μg「トーワ」	0.5mg1管	東和薬品	56.00	H26.6.20収載

【適応】①末梢性神経障害。②ビタミンB₁₂欠乏による巨赤芽球性貧血。【用法】①1日1回0.5mg(1A)、週3回筋注又は静注。②1日1回0.5mg、週3回筋注又は静注。約2ヶ月投与後、維持療法1～3ヶ月に1回0.5mg。

3311 生理食塩液

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
後	生食注シリンジ「オーツカ」5mL	5mL1筒	大塚工場＝大塚製薬	110.00	先発・代表薬／本品目も後発指定あり
後	生食注シリンジ「テバ」5mL	5mL1筒	テバ製薬	110.00	H26.6.20収載
後	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	10mL1筒	大塚工場＝大塚製薬	114.00	先発・代表薬／本品目も後発指定あり
後	生食注シリンジ「テバ」10mL	10mL1筒	テバ製薬	114.00	H26.6.20収載
後	生食注シリンジ「オーツカ」20mL	20mL1筒	大塚工場＝大塚製薬	134.00	先発・代表薬／本品目も後発指定あり
後	生食注シリンジ「テバ」20mL	20mL1筒	テバ製薬	134.00	H26.6.20収載

【適応】[注射]細胞外液欠乏時、ナトリウム欠乏時、クロール欠乏時、注射剤の溶解希釈剤。[外用]皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布。含そう・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進。[その他]医療用器具の洗浄。【用法】[注射]20～1,000mL、皮下注、静注又は点滴静注。又は適量を注射の希釈・溶解に用いる。[外用]皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布に、又は含そう・噴霧吸入に用いる。[その他]医療用器具の洗浄に使用。

3334 ダルテパリンナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	フラグミン静注5000単位/5mL	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	ファイザー=キッセイ	1,217.00	先発・代表薬
後	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「AFP」	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	エール薬品=アルフレッサファーマ	597.00	H26.6.20収載

【適応】①血液体外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析)。②汎発性血管内血液凝固症(DIC)。【用法】①出血性病変又は出血傾向を有しない患者には、体外循環開始時、15~20単位/kg、回路内に単回投与。体外循環開始後は7.5~10単位/kg/時、抗凝固薬注入ラインより持続注入。出血性病変又は出血傾向を有する患者には、体外循環開始時、10~15単位/kg、回路内に単回投与。体外循環開始後は7.5単位/kg/時、抗凝固薬注入ラインより持続注入。②1日75単位/kg、24時間かけて持続静注。

3999i オザグレルナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	カタクロット注射液40mg	40mg5mL1管	小野	2,237.00	先発・代表薬
	キサンボンS注射液40mg	40mg5mL1管	キッセイ	1,749.00	先発・代表薬
後	オザグレルNa点滴静注80mg「IP」	80mg4mL1管	アイロム=三和化学=光	1,245.00	H26.6.20収載/先発・代表薬に同一規格なし
後	オザグレルNa注80mgシリンジ「IP」	80mg4mL1筒	アイロム=光	1,915.00	H26.6.20収載/先発・代表薬に同一規格なし

【適応】①クモ膜下出血術後の脳血管れん縮及びこれに伴う脳虚血症の改善。②脳血栓症(急性期)に伴う運動障害の改善。【用法】①1日80mg、24時間かけ持続静注。術後早期に開始し、2週間持続投与が望ましい。②1回80mg、2時間かけ1日朝夕2回持続静注、約2週間実施。

3999i ゼレドロン酸水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	4mg5mL1瓶	ノバルティス	33,176.00	先発・代表薬
後	ゼレドロン酸点滴静注4mg/5mL「F」	4mg5mL1瓶	富士製薬	18,105.00	H26.6.20収載
後	ゼレドロン酸点滴静注4mg/5mL「NK」	4mg5mL1瓶	高田=日本化薬	18,105.00	H26.6.20収載
後	ゼレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サワイ」	4mg5mL1瓶	沢井	18,105.00	H26.6.20収載
後	ゼレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	4mg5mL1瓶	サンド	18,105.00	H26.6.20収載
後	ゼレドロン酸点滴静注4mg/5mL「日医工」	4mg5mL1瓶	イセイ=日医工	18,105.00	H26.6.20収載
後	ゼレドロン酸点滴静注4mg/5mL「ニプロ」	4mg5mL1瓶	ニプロ	18,105.00	H26.6.20収載
後	ゼレドロン酸点滴静注4mg/5mL「ファイザー」	4mg5mL1瓶	マイラン=ファイザー	18,105.00	H26.6.20収載
後	ゼレドロン酸点滴静注4mg/5mL「ヤクルト」	4mg5mL1瓶	バイオテックベイ=ヤクルト	18,105.00	H26.6.20収載
	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	4mg100mL1瓶	ノバルティス	33,176.00	先発・代表薬
後	ゼレドロン酸点滴静注4mg/100mL「バッグ「NK」	4mg100mL1袋	高田=日本化薬	18,105.00	H26.6.20収載
後	ゼレドロン酸点滴静注4mg/100mL「バッグ「サノフィ」	4mg100mL1袋	アイロム=サノフィ	18,105.00	H26.6.20収載
後	ゼレドロン酸点滴静注4mg/100mL「バッグ「トーワ」	4mg100mL1袋	東和薬品	18,105.00	H26.6.20収載
後	ゼレドロン酸点滴静注4mg/100mL「バッグ「日医工」	4mg100mL1袋	日医工	18,105.00	H26.6.20収載
後	ゼレドロン酸点滴静注4mg/100mL「バッグ「ニプロ」	4mg100mL1袋	ニプロ	18,105.00	H26.6.20収載
後	ゼレドロン酸点滴静注4mg/100mL「バッグ「ファイザー」	4mg100mL1袋	マイラン=ファイザー	18,105.00	H26.6.20収載
後	ゼレドロン酸点滴静注4mg/100mL「バッグ「ヤクルト」	4mg100mL1袋	バイオテックベイ=ヤクルト	18,105.00	H26.6.20収載

【適応】①悪性腫瘍による高カルシウム血症。②多発性骨髄腫による骨病変・固形癌骨転移による骨病変。【用法】4mgを、①15分以上かけて点滴静注。再投与は1週間の投与間隔をおく。②15分以上かけて3~4週間間隔で点滴静注。

3999i ナファモスタットメシル酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	注射用フサン50	50mg1瓶	鳥居	2,731.00	先発・代表薬
後	ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「フソー」	100mg1瓶	東菱=扶桑	1,436.00	H26.6.20収載/先発・代表薬に同一規格なし

【適応】①汎発性血管内血液凝固症。②出血性病変又は出血傾向を有する患者の血液体外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析及びプラズマフェレーシス)。【用法】①1日量を0.06~0.20mg/kg/時で24時間かけて持続静注。②体外循環開始に先だち20mgを生理食塩液500mLに溶解した液で血液回路内の洗浄・充てんを行う。体外循環開始後は20~50mg/時、持続注入。

3999i ヒアルロン酸ナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アルツ関節注25mg	1%2.5mL1管	生化学=科研	1,258.00	先発・代表薬
後	ヒアルロン酸ナトリウム関節注25mg「日医工」	1%2.5mL1管	日医工	408.00	H26.6.20収載
	アルツディスポ関節注25mg	1%2.5mL1筒	生化学=科研	1,453.00	先発・代表薬
	スベニールディスポ関節注25mg	1%2.5mL1筒	中外	1,332.00	先発・代表薬
後	ヒアルロン酸ナトリウム関節注25mgシリンジ「日医工」	1%2.5mL1筒	日医工	607.00	H26.6.20収載

【適応】変形性膝関節症、肩関節周囲炎。次の基準を全て満たす関節リウマチにおける膝関節痛/抗リウマチ薬等による治療で全身の病勢がコントロールできていても膝関節痛のある場合、全身の炎症症状がCRP値として10mg/dL以下の場合、膝関節の症状が軽症～中等症の場合、膝関節のLarsenX線分類がGradeI～IIIの場合。【用法】1回25mg(2.5mL)、1週間ごとに連続5回膝関節腔内又は肩関節(肩関節腔、肩峰下滑液包又は上腕二頭筋長頭腱鞘)内投与。(以下、スベニールのみ)変形性膝関節症で症状の維持を目的とする場合、2～4週間隔。

4240 ドセタキセル水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL	20mg1mL1瓶	サノフィ	17,322.00	先発・代表薬
後	ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL「サワイ」	20mg1mL1瓶	沢井	10,997.00	H26.6.20収載
後	ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL「NK」	20mg1mL1瓶	日本化薬	10,997.00	H26.6.20収載
	ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL	80mg4mL1瓶	サノフィ	59,156.00	先発・代表薬
後	ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「サワイ」	80mg4mL1瓶	沢井	38,480.00	H26.6.20収載
後	ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「NK」	80mg4mL1瓶	日本化薬	38,480.00	H26.6.20収載

【適応】①乳癌、非小細胞肺癌、胃癌、頭頸部癌。②卵巣癌。③食道癌、子宮体癌。④前立腺癌。【用法】①1日1回60mg/m²、3～4週間間隔で点滴静注。1回最高75mg/m²。②1日1回70mg/m²、3～4週間間隔で点滴静注。1回最高75mg/m²。③1日1回70mg/m²、3～4週間間隔で点滴静注。④1日1回75mg/m²、3週間間隔で点滴静注。以上、点滴は1時間以上かける。

6119i テイコブラニン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	注射用タゴシッド200mg	200mg1瓶	サノフィ	5,512.00	先発・代表薬
後	テイコブラニン点滴静注用400mg「トーフ」	400mg1瓶	東和薬品	4,293.00	H26.6.20収載/先発・代表薬に同一規格なし

【適応】<適応菌種>本剤感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)。<適応症>敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷・手術創等の二次感染、肺炎、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染。【用法】[成人]初日400mg又は800mg、2回分割、以後1日1回200mg又は400mg、30分以上かけて点滴静注。敗血症には初日800mg、2回分割点滴静注。以後1日1回400mg、30分以上かけて点滴静注。[乳・幼・小児]10mg/kg、12時間間隔で3回、以後6～10mg/kg(敗血症等の重症感染症では10mg/kg)を24時間ごとに30分以上かけて点滴静注。新生児(低出生体重児を含む)は、初回のみ16mg/kg、以後8mg/kgを24時間ごとに30分以上かけて点滴静注。

6131 ピペラシリンナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ペントシリン注射用1g	1g1瓶	富山化学=大正富山	406.00	先発・代表薬
後	ピペラシリンNa注射用1g「SN」	1g1瓶	シオノ=辰巳=摩耶堂	165.00	H26.6.20収載
	ペントシリン注射用2g	2g1瓶	富山化学=大正富山	688.00	先発・代表薬
後	ピペラシリンNa注射用2g「SN」	2g1瓶	シオノ=辰巳=摩耶堂	261.00	H26.6.20収載

【適応】<適応菌種>ピペラシリン感性的のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、大腸菌、シトロバクター属、肺炎桿菌、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、緑膿菌、バクテロイデス属、プレボテラ属(プレボテラ・ピビアを除く)。<適応症>敗血症、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、胆のう炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎。【用法】成人1日2～4g、2～4回分割静注又は筋注。小児1日50～125mg/kg、2～4回分割静注。難治性・重症感染症には成人1日8g、小児1日200mg/kgまで増量し静注。点滴静注は1～2gを1～2時間で投与。

6132 セファゾリンナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	セファメジンα注射用0.25g	250mg1瓶	アステラス	220.00	先発・代表薬
後	セファゾリンNa注射用0.25g「NP」	250mg1瓶	ニプロ	92.00	H26.6.20収載
	セファメジンα注射用1g	1g1瓶	アステラス	380.00	先発・代表薬
後	セファゾリンNa注射用1g「NP」	1g1瓶	ニプロ	133.00	H26.6.20収載
	セファメジンα注射用2g	2g1瓶	アステラス	796.00	先発・代表薬
後	セファゾリンNa注射用2g「NP」	2g1瓶	ニプロ	286.00	H26.6.20収載
	セファメジンα点滴用キット1g	1g1キット(生理食塩液100mL付)	アステラス	698.00	先発・代表薬
後	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「NP」	1g1キット(生理食塩液100mL付)	ニプロ=日医工	609.00	H26.6.20収載

【適応】<適応菌種>セファゾリン感性的のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、肺炎桿菌、プロテウス・ミラビリス、プロビデンシア属。<適応症>敗血症、感染性心内膜炎、表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷・手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、関節炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、胆のう炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、眼内炎(全眼球炎を含む)、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎。【用法】1日成人1g、小児20～40mg/kg、2回分割、緩徐に静注又は筋注(キットは点滴静注のみ)。効果不十分時は、1日成人1.5～3g、小児50mg/kg、3回分割投与。特に重篤な場合、1日成人5g、小児100mg/kgまで分割投与可。輸液に加えて点滴静注可(注射用のみ)。

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

6132 セフォチアム塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	パンスポリン静注用0.25g	250mg1瓶	武田	371.00	先発・代表薬
	ハロスポア静注用0.25g	250mg1瓶	富山化学=大正富山	316.00	先発・代表薬
後	セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「SN」	250mg1瓶	シオノ=東和薬品=辰巴=摩耶堂	185.00	H26.6.20収載
	パンスポリン静注用0.5g	500mg1瓶	武田	556.00	先発・代表薬
	ハロスポア静注用0.5g	500mg1瓶	富山化学=大正富山	489.00	先発・代表薬
後	セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「SN」	500mg1瓶	シオノ=東和薬品=辰巴=摩耶堂	273.00	H26.6.20収載
	パンスポリン静注用1g	1g1瓶	武田	801.00	先発・代表薬
	ハロスポア静注用1g	1g1瓶	富山化学=大正富山	715.00	先発・代表薬
後	セフォチアム塩酸塩静注用1g「SN」	1g1瓶	シオノ=東和薬品=辰巴=摩耶堂=原沢	440.00	H26.6.20収載

【適応】<適応菌種>セフォチアム感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア・レットゲリ、インフルエンザ菌。<適応症>敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷・手術創等の二次感染、骨髄炎、関節炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、腹膜炎、胆のう炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎、中耳炎、副鼻腔炎。【用法】成人1日0.5～2g、2～4回分割、小児1日40～80mg/kgを3～4回分割静注。成人の敗血症には1日4gまで増量可。小児の敗血症・化膿性髄膜炎等の重症・難治性感染症には1日160mg/kgまで増量可。成人の場合1回量0.25～2gを30分～2時間で点滴静注可。小児の場合は投与量を考慮し30分～1時間で点滴静注可。

6132 セフトアジジム水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	モダシン静注用0.5g	500mg1瓶	GSK	727.00	先発・代表薬
後	セフトアジジム静注用0.5g「SN」	500mg1瓶	シオノ=東和薬品=富士フィルムファーマ	414.00	H26.6.20収載
	モダシン静注用1g	1g1瓶	GSK	1,096.00	先発・代表薬
後	セフトアジジム静注用1g「SN」	1g1瓶	シオノ=東和薬品=富士フィルムファーマ=光=原沢	494.00	H26.6.20収載

【適応】<適応菌種>本剤感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、シュードモナス属、緑膿菌、バークホルデリア・セパシア、ステノトロホモナス(ザントモナス)・マルトフィリア、アシネトバクター属、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属(プレボテラ・ピビアを除く)。<適応症>敗血症、感染性心内膜炎、外傷・熱傷・手術創等の二次感染、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、腹膜炎、胆のう炎、胆管炎、肝膿瘍、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎、中耳炎、副鼻腔炎。【用法】成人1日1～2g、2回分割静注。小児1日40～100mg/kg、2～4回分割静注。難治性又は重症感染症には1日成人4g、小児150mg/kgまで増量し、2～4回分割投与。未熟児・新生児1回20mg/kgを、生後0～3日齢には1日2～3回、生後4日齢以降には1日3～4回静注。なお難治性又は重症感染症には、症状に応じて1日量を150mg/kgまで増量し、2～4回に分割投与。以上、30分～2時間で点滴静注可。

6152 ミノサイクリン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ミノマイシン点滴静注用100mg	100mg1瓶	ファイザー	513.00	先発・代表薬
後	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「F」	100mg1瓶	富士製薬	182.00	H26.6.20収載

【適応】<適応菌種>ミノサイクリン感性の黄色ブドウ球菌、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、モラクセラ・ラクナータ(モラー・アクセンフェルト菌)、炭疽菌、大腸菌、クレブシエラ属、エンテロバクター属、インフルエンザ菌、シュードモナス・フルオレッセンス、緑膿菌、バークホルデリア・セパシア、ステノトロホモナス(ザントモナス)・マルトフィリア、アシネトバクター属、フラボバクテリウム属、レジオネラ・ニューモフィラ、リケッチア属(オリエンチア・ツツガムシ)、クラミジア属、肺炎マイコプラズマ(マイコプラズマ・ニューモニエ)。<適応症>敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、炭疽、つつが虫病、オウム病。【用法】初回100～200mg、以後12時間ないし24時間ごとに100mgを補液に溶かし、30分～2時間かけて点滴静注。

7219i イオヘキソール

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	オムニパーク300注シリンジ110mL	64.71%110mL 1筒	第一三共	9,443.00	先発・代表薬
後	イオヘキソール300注シリンジ110mL「HK」	64.71%110mL 1筒	光	6,058.00	H26.6.20収載
後	イオソール注300シリンジ110mL	64.71%110mL 1筒	東和薬品	5,462.00	H26.6.20収載
	オムニパーク350注シリンジ70mL	75.49%70mL 1筒	第一三共	6,526.00	先発・代表薬
後	イオヘキソール350注シリンジ70mL「HK」	75.49%70mL 1筒	光	5,082.00	H26.6.20収載
	オムニパーク350注シリンジ100mL	75.49%100mL 1筒	第一三共	9,470.00	先発・代表薬
後	イオヘキソール350注シリンジ100mL「HK」	75.49%100mL 1筒	光	6,525.00	H26.6.20収載
後	イオベリン350注シリンジ100mL	75.49%100mL 1筒	テバ製薬	6,287.00	H26.6.20収載

【適応】①血管心臓撮影(肺動脈撮影を含む)。②大動脈撮影。③脳血管撮影。④選択的血管撮影。⑤四肢血管撮影。⑥デジタルX線撮影法による静脈性血管撮影。⑦デジタルX線撮影法による動脈性血管撮影。⑧コンピューター断層撮影における造影。⑨静脈性尿路撮影。⑩小児血管心臓撮影(肺動脈撮影を含む)。⇒(300:③~⑨, 350:①②, ④~⑥, ⑧~⑩)【用法】①心腔内撮影20~40mL, 冠状動脈撮影3~8mL, 肺動脈撮影20~40mL。②30~50mL。③5~15mL。④5~50mL。⑤10~50mL。⑥20~50mL。⑦1.5~50mL。⑧40~100mL。(以下は300のみ)高速ラセンコンピューターでの腹部撮影には150mLまで可。⑨300:50~100mL, 350:40mL。⑩心腔内撮影・肺動脈撮影・上行大動脈撮影0.5~2mL/kg, 冠状動脈撮影2~4mL。

以上

薬効・薬価リスト平成26年版 追補情報(平成26年6月)

IV. ジェネリック(後発医薬品)とそれに対応する先発・代表薬一覧表(歯科用薬剤)

平成26年6月20日告示品目における診療報酬上の後発医薬品と、それに対応する先発・代表薬をまとめています(平成26年7月4日現在, 入手できた情報による)。
 薬効分類・成分名別に掲載しています。
 商品名の左に「後」とあるものが, 診療報酬上の後発医薬品です。
 背景 色が, 先発・代表薬を指します(便宜的に後発医薬品等を選択している場合があります)。
 成分内において, 適応や用法に違いがあり, かつ簡便に記号で分類できる場合, 薬価欄の右に対応する番号とともに表記しました。記号は
 ○: 適応ないし用法あり
 △: 適応ないし用法を持つが, 一部に違いあり
 -: 適応・用法なし
 を使用しています。これらはいくまで簡便な分類ですので, 各成分別表記末尾の適応・用法表記とあわせてご覧ください。
 また一覧は対象品目を抜粋したもので, 必ずしも同成分の品目全てに当てはまりません。さらに, 作成時の情報から更新・変更されている場合がありますので, 処方・調剤にあたっては必ず最新の添付文書をご確認ください。

2710b リドカイン塩酸塩・アドレナリン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	歯科用キシロカインカートリッジ	1.8mL1管	デンツプライ	78.20	先発・代表薬
後	エピリド配合注歯科用カートリッジ1.8mL	1.8mL1管	ニプロ	60.90	H26.6.20収載
【適応】歯科領域における浸潤麻酔・伝達麻酔。【用法】[浸潤・伝達麻酔]0.3~1.8mL。[口腔外科領域の麻酔]3~5mL。					

以 上

薬効・薬価リスト平成26年版 追補情報(平成26年6月)

V. ジェネリック(後発医薬品)以外の掲載品目

平成26年6月20日告示品目における, 診療報酬上の後発医薬品以外の品目をまとめています(平成26年7月4日現在, 入手できた情報による)。

投与	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
内	アセトアミノフェン「JG」原末	1g	長生堂=日本ジェネリック	8.00	H26.6.20掲載
内	デカドロン錠4mg	4mg1錠	日医工	37.80	H26.6.20掲載
注	サンドスタチンLAR筋注用キット10mg	10mg1キット(溶解液付)	ノバルティス	124,462.00	H26.6.20掲載
注	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	20mg1キット(溶解液付)	ノバルティス	221,913.00	H26.6.20掲載
注	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	30mg1キット(溶解液付)	ノバルティス	312,396.00	H26.6.20掲載
注	照射赤血球液-LR「日赤」	血液200mLに由来する赤血球1袋	日赤	8,864.00	H26.6.20掲載
注	照射赤血球液-LR「日赤」	血液400mLに由来する赤血球1袋	日赤	17,726.00	H26.6.20掲載
注	赤血球液-LR「日赤」	血液200mLに由来する赤血球1袋	日赤	8,402.00	H26.6.20掲載
注	赤血球液-LR「日赤」	血液400mLに由来する赤血球1袋	日赤	16,805.00	H26.6.20掲載
注	注射用水バッグ「フソー」	1L1袋	扶桑	216.00	H26.6.20掲載
外	アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「日新」	50mg1個	日新製薬	19.30	H26.6.20掲載/後発除外品目
外	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」	100mg1個	日新製薬	19.30	H26.6.20掲載/後発除外品目
外	メプチンスイングヘラー10μg吸入100回	1mg1キット	大塚製薬	1,006.80	H26.6.20掲載

以 上