

薬効・薬価リスト平成29年版 追補情報(平成29年6月)

I. ジェネリック(後発医薬品)とそれに対応する先発・代表薬一覧表(内用薬)

平成29年6月15日告示(16日適用)品目における診療報酬上の後発医薬品と、それに対応する先発・代表薬をまとめています(平成29年7月3日現在, 入手できた情報による)。
 薬効分類・成分名別に掲載しています。
 商品名の左に「後」とあるものが, 診療報酬上の後発医薬品です。
 背景色が, 先発・代表薬を指します(便宜的に後発医薬品等を選択している場合があります)。
 成分内において, 適応や用法に違いがあり, かつ簡便に記号で分類できる場合, 薬価欄の右に対応する番号とともに表記しました。記号は
 ○: 適応ないし用法あり
 △: 適応ないし用法を持つが, 一部に違いあり
 -: 適応・用法なし
 を使用しています。これらはあくまで簡便な分類ですので, 各成分別表記末尾の適応・用法表記とあわせてご覧ください。
 また一覧は対象品目を抜粋したもので, 必ずしも同成分の品目全てに当てはまりません。さらに, 作成時の情報から更新・変更されている場合がありますので, 処方・調剤にあたっては必ず最新の添付文書をご確認ください。

1124 プロチゾラム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	レンドルミン錠0.25mg	0.25mg1錠	日本ベーリンガー	24.30	先発・代表薬
後	プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」	0.25mg1錠	田辺三菱吉富薬品	9.90	H29.6.16収載

【適応】①不眠症。②麻酔前投薬。【用法】①1回0.25mg, 就寝前。②手術前夜1回0.25mg, 就寝前。麻酔前1回0.5mg。

1141 アセトアミノフェン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
後	カロナール錠200	200mg1錠	あゆみ製薬	7.60	先発・代表薬/本品目も後発指定あり
後	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	200mg1錠	丸石	7.60	H29.6.16収載
後	カロナール錠300	300mg1錠	あゆみ製薬	8.50	先発・代表薬/本品目も後発指定あり
後	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」	300mg1錠	丸石	8.50	H29.6.16収載

【適応】①次の疾患・症状の鎮痛/頭痛, 耳痛, 症候性神経痛, 腰痛症, 筋肉痛, 打撲痛, 捻挫痛, 月経痛, 分娩後痛, 癌による疼痛, 歯痛, 歯科治療後の疼痛, 変形性関節症。②次の疾患の解熱・鎮痛/急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)。③小児科領域における解熱・鎮痛。【用法】①1回300~1000mg。投与間隔4~6時間以上, 1日総量4000mgまで。②1回300~500mg, 頓用。原則として1日2回まで, 1日最大1,500mg。③幼児・小児1回10~15mg/kg。投与間隔4~6時間以上, 1日総量60mg/kg。ただし成人量を超えない。

1149i エトドラク

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	オステラック錠100	100mg1錠	あすか製薬=武田	18.40	先発・代表薬
	ハイベン錠100mg	100mg1錠	日本新薬	18.20	先発・代表薬
後	エトドラク錠100mg「日医工」	100mg1錠	日医工	8.00	H29.6.16収載
	オステラック錠200	200mg1錠	あすか製薬=武田	25.40	先発・代表薬
	ハイベン錠200mg	200mg1錠	日本新薬	25.30	先発・代表薬
後	エトドラク錠200mg「日医工」	200mg1錠	日医工	11.40	H29.6.16収載

【適応】次の疾患・症状の消炎・鎮痛/関節リウマチ, 変形性関節症, 腰痛症, 肩関節周囲炎, 頸腕症候群, 腱鞘炎, 手術後, 外傷後。【用法】1日400mg, 分2朝・夕食後。

1149i ザルトプロフェン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ペオン錠80	80mg1錠	ゼリア	17.60	先発・代表薬
	ソレトン錠80	80mg1錠	ケミファ	17.50	先発・代表薬
後	ザルトプロフェン錠80mg「トーワ」	80mg1錠	東和薬品	9.90	H29.6.16収載

【適応】次の疾患・症状の消炎・鎮痛/関節リウマチ, 変形性関節症, 腰痛症, 肩関節周囲炎, 頸腕症候群, 手術後, 外傷後, 抜歯後。【用法】1回80mg, 1日3回。頓用は, 1回80~160mg。

1149i ロキソプロフェンナトリウム水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ロキソニン細粒10%	10%1g	第一三共	29.30	先発・代表薬
後	ロキソプロフェンNa細粒10%「TCK」	10%1g	辰巳	12.70	H29.6.16収載
	ロキソニン錠60mg	60mg1錠	第一三共	15.90	先発・代表薬
後	ロキソプロフェンNa錠60mg「NPI」	60mg1錠	日本薬工	7.80	H29.6.16収載
後	ロキソプロフェンNa錠60mg「TCK」	60mg1錠	辰巳	7.80	H29.6.16収載

【適応】①次の疾患・症状の消炎・鎮痛/関節リウマチ, 変形性関節症, 腰痛症, 肩関節周囲炎, 頸腕症候群, 歯痛, 手術後, 外傷後, 抜歯後。②次の疾患の解熱・鎮痛/急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)。【用法】ロキソプロフェンナトリウムとして①1回60mg(細粒:0.6g), 1日3回。頓用1回60~120mg(細粒:0.6~1.2g)。②1回60mg, 頓用。原則として1日2回まで, 1日最大180mg(細粒:1.8g)。

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

1179i アリピラゾール

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	③	④	備考
	エビリファイ内用液0.1%	0.1%1mL	大塚製薬	83.40	○	○	○	○	先発・代表薬
後	アリピラゾール内用液3mg分包「サワイ」	0.1%3mL1包	沢井	106.70	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 先発・代表薬に同一規格なし
後	アリピラゾール内用液3mg分包「タカタ」	0.1%3mL1包	高田＝共和薬品	106.70	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾール内用液3mg分包「トーワ」	0.1%3mL1包	東和薬品	106.70	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾール内用液分包3mg「武田テバ」	0.1%3mL1包	武田テバファーマ＝武田	106.70	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾール内用液分包3mg「ニプロ」	0.1%3mL1包	ニプロ＝田辺三菱＝田辺販売＝吉富薬品	106.70	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾール内用液分包3mg「明治」	0.1%3mL1包	MeijiSeika	106.70	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾール内用液6mg分包「サワイ」	0.1%6mL1包	沢井	213.30	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾール内用液6mg分包「タカタ」	0.1%6mL1包	高田＝共和薬品	213.30	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾール内用液6mg分包「トーワ」	0.1%6mL1包	東和薬品	213.30	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾール内用液分包6mg「武田テバ」	0.1%6mL1包	武田テバファーマ＝武田	213.30	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾール内用液分包6mg「ニプロ」	0.1%6mL1包	ニプロ＝田辺三菱＝田辺販売＝吉富薬品	213.30	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾール内用液分包6mg「明治」	0.1%6mL1包	MeijiSeika	213.30	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾール内用液12mg分包「サワイ」	0.1%12mL1包	沢井	426.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾール内用液12mg分包「タカタ」	0.1%12mL1包	高田＝共和薬品	426.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾール内用液12mg分包「トーワ」	0.1%12mL1包	東和薬品	426.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾール内用液分包12mg「武田テバ」	0.1%12mL1包	武田テバファーマ＝武田	426.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾール内用液分包12mg「ニプロ」	0.1%12mL1包	ニプロ＝田辺三菱＝田辺販売＝吉富薬品	426.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾール内用液分包12mg「明治」	0.1%12mL1包	MeijiSeika	426.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
	エビリファイ散1%	1%1g	大塚製薬	168.20	○	○	○	○	先発・代表薬
後	アリピラゾール散1%「アメル」	1%1g	共和薬品	72.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール散1%「オーハラ」	1%1g	大原＝共創未来ファーマ	72.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール散1%「トーワ」	1%1g	東和薬品	72.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール散1%「日医工」	1%1g	日医工	72.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール散1%「ニプロ」	1%1g	ニプロ	72.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載

(つづく)

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

(アリピラゾールのつづき)

後	アリピラゾール散1%「明治」	1%1g	MeijiSeika	72.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール散1%「ヨシトミ」	1%1g	田辺三菱＝田辺販売 ＝吉富薬品	72.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール細粒1%「タカタ」	1%1g	高田	72.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 先発・代 表薬に同 一剤形なし
	エビリファイ錠3mg	3mg1錠	大塚製薬	82.50	○	○	○	○	先発・代 表薬
後	アリピラゾール錠3mg「JG」	3mg1錠	日本ジェネリック	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール錠3mg「YD」	3mg1錠	陽進堂	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール錠3mg「アメル」	3mg1錠	共和薬品	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール錠3mg「オーハラ」	3mg1錠	大原＝共創未来ファ ーマ	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール錠3mg「サワイ」	3mg1錠	沢井	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール錠3mg「タカタ」	3mg1錠	高田	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール錠3mg「トーフ」	3mg1錠	東和薬品	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール錠3mg「日医工」	3mg1錠	日医工	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール錠3mg「ニプロ」	3mg1錠	ニプロ	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール錠3mg「明治」	3mg1錠	MeijiSeika	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール錠3mg「ヨシトミ」	3mg1錠	田辺三菱＝田辺販売 ＝吉富薬品	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載
	エビリファイOD錠3mg	3mg1錠	大塚製薬	82.50	○	○	○	○	先発・代 表薬／ 口腔崩 壊錠
後	アリピラゾールOD錠3mg「JG」	3mg1錠	日本ジェネリック	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 口腔崩 壊錠
後	アリピラゾールOD錠3mg「アメル」	3mg1錠	共和薬品	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾールOD錠3mg「オーハラ」	3mg1錠	大原＝共創未来ファ ーマ	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾールOD錠3mg「杏林」	3mg1錠	キョーリンメディオ＝ 杏林＝陽進堂	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾールOD錠3mg「タカタ」	3mg1錠	高田	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾールOD錠3mg「武田テバ」	3mg1錠	武田テバファーマ＝武 田	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾールOD錠3mg「トーフ」	3mg1錠	東和薬品	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾールOD錠3mg「日医工」	3mg1錠	日医工	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾールOD錠3mg「ニプロ」	3mg1錠	ニプロ	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾールOD錠3mg「明治」	3mg1錠	MeijiSeika	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃
後	アリピラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」	3mg1錠	田辺三菱＝田辺販売 ＝吉富薬品	28.40	○	—	—	—	H29.6.16 収載／ 〃

(つづく)

(アリピプラゾールのつづき)

	エビリファイ錠6mg	6mg1錠	大塚製薬	156.70	○	○	○	○	先発・代表薬
後	アリピプラゾール錠6mg「JG」	6mg1錠	日本ジェネリック	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピプラゾール錠6mg「YD」	6mg1錠	陽進堂	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピプラゾール錠6mg「アメル」	6mg1錠	共和薬品	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピプラゾール錠6mg「オーハラ」	6mg1錠	大原＝共創未来ファーマ	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	6mg1錠	沢井	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピプラゾール錠6mg「タカタ」	6mg1錠	高田	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピプラゾール錠6mg「トーフ」	6mg1錠	東和薬品	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピプラゾール錠6mg「日医工」	6mg1錠	日医工	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピプラゾール錠6mg「ニプロ」	6mg1錠	ニプロ	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピプラゾール錠6mg「明治」	6mg1錠	MeijiSeika	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピプラゾール錠6mg「ヨシトミ」	6mg1錠	田辺三菱＝田辺販売＝吉富薬品	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載
	エビリファイOD錠6mg	6mg1錠	大塚製薬	156.70	○	○	○	○	先発・代表薬 ／ 口腔崩壊錠
後	アリピプラゾールOD錠6mg「JG」	6mg1錠	日本ジェネリック	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載 ／ 口腔崩壊錠
後	アリピプラゾールOD錠6mg「アメル」	6mg1錠	共和薬品	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載 ／ "
後	アリピプラゾールOD錠6mg「オーハラ」	6mg1錠	大原＝共創未来ファーマ	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載 ／ "
後	アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」	6mg1錠	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載 ／ "
後	アリピプラゾールOD錠6mg「タカタ」	6mg1錠	高田	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載 ／ "
後	アリピプラゾールOD錠6mg「武田テバ」	6mg1錠	武田テバファーマ＝武田	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載 ／ "
後	アリピプラゾールOD錠6mg「トーフ」	6mg1錠	東和薬品	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載 ／ "
後	アリピプラゾールOD錠6mg「日医工」	6mg1錠	日医工	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載 ／ "
後	アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」	6mg1錠	ニプロ	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載 ／ "
後	アリピプラゾールOD錠6mg「明治」	6mg1錠	MeijiSeika	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載 ／ "
後	アリピプラゾールOD錠6mg「ヨシトミ」	6mg1錠	田辺三菱＝田辺販売＝吉富薬品	54.00	○	—	—	—	H29.6.16 収載 ／ "
	エビリファイ錠12mg	12mg1錠	大塚製薬	297.80	○	○	○	○	先発・代表薬
後	アリピプラゾール錠12mg「JG」	12mg1錠	日本ジェネリック	102.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピプラゾール錠12mg「YD」	12mg1錠	陽進堂	102.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピプラゾール錠12mg「アメル」	12mg1錠	共和薬品	102.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載
後	アリピプラゾール錠12mg「オーハラ」	12mg1錠	大原＝共創未来ファーマ	102.60	○	—	—	—	H29.6.16 収載

(つづく)

(アリピラゾールのつづき)

後	アリピラゾール錠12mg「サワイ」	12mg1錠	沢井	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール錠12mg「タカタ」	12mg1錠	高田	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール錠12mg「トーワ」	12mg1錠	東和薬品	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール錠12mg「日医工」	12mg1錠	日医工	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール錠12mg「ニプロ」	12mg1錠	ニプロ	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール錠12mg「明治」	12mg1錠	MeijiSeika	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載
後	アリピラゾール錠12mg「ヨシトミ」	12mg1錠	田辺三菱＝田辺販売 ＝吉富薬品	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載
	エビリファイOD錠12mg	12mg1錠	大塚製薬	297.80	○	○	○	○	先発・代 表薬/ 口腔崩 壊錠
後	アリピラゾールOD錠12mg「JG」	12mg1錠	日本ジェネリック	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載/ 口腔崩 壊錠
後	アリピラゾールOD錠12mg「アメル」	12mg1錠	共和薬品	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載/ 〃
後	アリピラゾールOD錠12mg「オーハラ」	12mg1錠	大原＝共創未来ファ ーマ	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載/ 〃
後	アリピラゾールOD錠12mg「杏林」	12mg1錠	キョーリンメディオ＝ 杏林＝陽進堂	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載/ 〃
後	アリピラゾールOD錠12mg「タカタ」	12mg1錠	高田	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載/ 〃
後	アリピラゾールOD錠12mg「武田テバ」	12mg1錠	武田テバファーマ＝武 田	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載/ 〃
後	アリピラゾールOD錠12mg「トーワ」	12mg1錠	東和薬品	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載/ 〃
後	アリピラゾールOD錠12mg「日医工」	12mg1錠	日医工	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載/ 〃
後	アリピラゾールOD錠12mg「ニプロ」	12mg1錠	ニプロ	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載/ 〃
後	アリピラゾールOD錠12mg「明治」	12mg1錠	MeijiSeika	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載/ 〃
後	アリピラゾールOD錠12mg「ヨシトミ」	12mg1錠	田辺三菱＝田辺販売 ＝吉富薬品	102.60	○	-	-	-	H29.6.16 収載/ 〃
	エビリファイOD錠24mg	24mg1錠	大塚製薬	566.00	○	○	-	-	先発・代 表薬/ 口腔崩 壊錠
後	アリピラゾールOD錠24mg「JG」	24mg1錠	日本ジェネリック	195.00	○	-	-	-	H29.6.16 収載/ 口腔崩 壊錠
後	アリピラゾールOD錠24mg「アメル」	24mg1錠	共和薬品	195.00	○	-	-	-	H29.6.16 収載/ 〃
後	アリピラゾールOD錠24mg「オーハラ」	24mg1錠	大原＝共創未来ファ ーマ	195.00	○	-	-	-	H29.6.16 収載/ 〃
後	アリピラゾールOD錠24mg「杏林」	24mg1錠	キョーリンメディオ＝ 杏林＝陽進堂	195.00	○	-	-	-	H29.6.16 収載/ 〃
後	アリピラゾールOD錠24mg「タカタ」	24mg1錠	高田	195.00	○	-	-	-	H29.6.16 収載/ 〃
後	アリピラゾールOD錠24mg「武田テバ」	24mg1錠	武田テバファーマ＝武 田	195.00	○	-	-	-	H29.6.16 収載/ 〃

(つづく)

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

(アリピラゾールのつづき)

後	アリピラゾールOD錠24mg「トーフ」	24mg1錠	東和薬品	195.00	○	-	-	-	H29.6.16 収載／ ＼
後	アリピラゾールOD錠24mg「日医工」	24mg1錠	日医工	195.00	○	-	-	-	H29.6.16 収載／ ＼
後	アリピラゾールOD錠24mg「ニプロ」	24mg1錠	ニプロ	195.00	○	-	-	-	H29.6.16 収載／ ＼
後	アリピラゾールOD錠24mg「明治」	24mg1錠	MeijiSeika	195.00	○	-	-	-	H29.6.16 収載／ ＼
後	アリピラゾールOD錠24mg「ヨシトミ」	24mg1錠	田辺三菱＝田辺販売 ＝吉富薬品	195.00	○	-	-	-	H29.6.16 収載／ ＼
後	アリピラゾール錠24mg「YD」	24mg1錠	陽進堂	195.00	○	-	-	-	H29.6.16 収載／ 先発・代 表薬に同 一規格 の普通 錠なし
後	アリピラゾール錠24mg「アメル」	24mg1錠	共和薬品	195.00	○	-	-	-	H29.6.16 収載／ ＼
後	アリピラゾール錠24mg「オーハラ」	24mg1錠	大原	195.00	○	-	-	-	H29.6.16 収載／ ＼
後	アリピラゾール錠24mg「サワイ」	24mg1錠	沢井	195.00	○	-	-	-	H29.6.16 収載／ ＼
後	アリピラゾール錠24mg「トーフ」	24mg1錠	東和薬品	195.00	○	-	-	-	H29.6.16 収載／ ＼
後	アリピラゾール錠24mg「明治」	24mg1錠	MeijiSeika	195.00	○	-	-	-	H29.6.16 収載／ ＼

【適応】①統合失調症。②双極性障害における躁症状の改善。③うつ病・うつ状態(既存治療で十分な効果が認められない場合に限る)。④小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性。⇒(③④は24mg錠を除くエビリファイのみ、②はエビリファイのみ)【用法】①開始量1日6～12mg(散:0.6～1.2g,液:6～12mL),維持量1日6～24mg(散:0.6～2.4g,液:6～24mL),分1～2。②1日1回12～24mg(散:1.2～2.4g,液:12～24mL)。開始量は24mg。以上,1日30mg(散:3g,液:30mL)まで。③1日1回3mg(散:0.3g,液:3mL)。増量幅は1日3mg。④1日1回,1mg(散:0.1g,液:1mL)を開始量,1～15mg(散:1.5g,液:15mL)を維持量。増量幅は1日最大3mg。以上,1日15mgまで。

1179i スルトブリド塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	バルネチール錠50	50mg1錠	バイエル＝大日本住友	14.00	先発・代表薬
後	スルトブリド塩酸塩錠50mg「ヨシトミ」	50mg1錠	全星＝田辺三菱＝吉富薬品	5.60	H29.6.16収載
	バルネチール錠100	100mg1錠	バイエル＝大日本住友	26.10	先発・代表薬
後	スルトブリド塩酸塩錠100mg「ヨシトミ」	100mg1錠	全星＝田辺三菱＝吉富薬品	7.90	H29.6.16収載

【適応】躁病,統合失調症の興奮及び幻覚・妄想状態。【用法】スルトブリドとして1日300～600mg分服。1日1,800mgまで増量可。

1179i ハロペリドール

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	セレネース細粒1%	1%1g	大日本住友	45.40	先発・代表薬
後	ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」	1%1g	田辺三菱＝吉富薬品	14.10	H29.6.16収載
	セレネース錠0.75mg	0.75mg1錠	大日本住友	7.80	先発・代表薬
後	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	0.75mg1錠	田辺三菱＝吉富薬品	5.90	H29.6.16収載
	セレネース錠1.5mg	1.5mg1錠	大日本住友	9.40	先発・代表薬
後	ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」	1.5mg1錠	田辺三菱＝吉富薬品	6.00	H29.6.16収載
	セレネース錠3mg	3mg1錠	大日本住友	9.90	先発・代表薬
後	ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」	3mg1錠	田辺三菱＝吉富薬品	6.30	H29.6.16収載
後	ハロペリドール錠2mg「ヨシトミ」	2mg1錠	田辺三菱＝吉富薬品	6.10	H29.6.16収載／先発・代表薬に同一規格なし

【適応】統合失調症,躁病。【用法】初回量1日0.75～2.25mg(細粒:0.075～0.225g),以後漸増。維持量1日3～6mg(細粒:0.3～0.6g)。

1190 ドネベジル塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	備考
	アリセプト錠3mg	3mg1錠	エーザイ	203.50	○	○	先発・代表薬
後	ドネベジル塩酸塩錠3mg「クニヒロ」	3mg1錠	皇漢堂	85.50	○	—	H29.6.16収載
	アリセプト錠5mg	5mg1錠	エーザイ	300.60	○	○	先発・代表薬
後	ドネベジル塩酸塩錠5mg「クニヒロ」	5mg1錠	皇漢堂	125.70	○	—	H29.6.16収載

【適応】①アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制。②レビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制。⇒(②はアリセプトのみ)【用法】①1日1回3mgから開始, 1~2週間後に5mgに増量。高度のアルツハイマー型認知症患者は5mgで4週間以上経過後, 10mgに増量。②1日1回3mgから開始, 1~2週間後に5mgに増量。5mgで4週間以上経過後, 10mgに増量。症状により5mgまで減量可。

1339i ジフェンドール塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価			備考
	セファドール錠25mg	25mg1錠	日本新薬	12.50	先発	代表薬	
後	ジフェンドール塩酸塩錠25mg「トーフ」	25mg1錠	東和薬品	5.60	H29.6.16	収載	

【適応】内耳障害に基づくめまい。【用法】1回25~50mg, 1日3回。

1339i ベタヒスチンメシル酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価			備考
	メリスロン錠6mg	6mg1錠	エーザイ	8.50	先発	代表薬	
後	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	6mg1錠	ジェイドルフ=東和薬品	6.00	H29.6.16	収載	
	メリスロン錠12mg	12mg1錠	エーザイ	11.70	先発	代表薬	
後	ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「JD」	12mg1錠	ジェイドルフ=東和薬品	6.30	H29.6.16	収載	

【適応】次の疾患に伴うめまい・めまい感/メニエール病, メニエール症候群, 眩暈症。【用法】1回6~12mg, 1日3回。

2123 プロプラノロール塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価			備考
	インデラル錠10mg	10mg1錠	アストラゼネカ	14.10	先発	代表薬	
後	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーフ」	10mg1錠	東和薬品	6.30	H29.6.16	収載	

【適応】①軽症~中等症の本態性高血圧症。②期外収縮(上室性・心室性), 発作性頻拍の予防, 頻拍性心房細動(徐脈効果), 洞性頻脈, 新鮮心房細動, 発作性心房細動の予防。③狭心症。褐色細胞腫手術時。④片頭痛発作の発症抑制。⑤右心室流出路狭窄による低酸素発作の発症抑制。【用法】①成人1日30~60mgより開始, 効果不十分時は120mgまで漸増, 分3。②成人1日30mgより開始, 効果不十分時は60mg, 90mgと漸増, 分3。小児1日0.5~2mg/kg, 分3~4。効果不十分時は1日4mg/kgまで増量可。1日90mgまで。③成人1日30mgより開始, 効果不十分時は60mg, 90mgと漸増, 分3。④成人1日20~30mgより開始, 効果不十分時は60mgまで漸増, 分2~3。⑤乳幼児1日0.5~2mg/kg, 低用量から開始, 分3~4。効果不十分時は1日4mg/kgまで増量可。

2139i フロセミド

	商品名	規格単位	会社名	薬価			備考
	ランックス錠10mg	10mg1錠	サノフィ=日医工	9.10	先発	代表薬	
後	フロセミド錠10mg「SN」	10mg1錠	シオノ=江州	6.00	H29.6.16	収載	
後	フロセミド錠10mg「武田テバ」	10mg1錠	武田テバファーマ=武田	6.00	H29.6.16	収載	

【適応】本態性高血圧症。腎性高血圧症, 悪性高血圧, 心性浮腫(うっ血性心不全), 腎性浮腫, 肝性浮腫, 月経前緊張症, 末梢血管障害による浮腫, 尿路結石排出促進。【用法】1日1回40~80mg, 連日又は隔日。腎機能不全等の場合にはさらに大量を用いることもある。悪性高血圧には通常, 他の降圧剤と併用。

2149i オルメサルタン メドキシミル

	商品名	規格単位	会社名	薬価			備考
	オルメテックOD錠5mg	5mg1錠	第一三共	31.50	H29.6.16	収載	口腔崩壊錠
後	オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	5mg1錠	第一三共エスファ	15.60	H29.6.16	収載	口腔崩壊錠
	オルメテックOD錠10mg	10mg1錠	第一三共	59.30	先発	代表薬	口腔崩壊錠
後	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	10mg1錠	第一三共エスファ	29.60	H29.6.16	収載	口腔崩壊錠
	オルメテックOD錠20mg	20mg1錠	第一三共	112.80	先発	代表薬	口腔崩壊錠
後	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠	第一三共エスファ	56.40	H29.6.16	収載	口腔崩壊錠
	オルメテックOD錠40mg	40mg1錠	第一三共	171.50	先発	代表薬	口腔崩壊錠
後	オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	40mg1錠	第一三共エスファ	84.60	H29.6.16	収載	口腔崩壊錠

【適応】高血圧症。【用法】1日1回10~20mg, 1日5~10mgから開始。1日最大量40mg。

2149i テルミサルタン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ミカルディス錠20mg	20mg1錠	日本ベーリンガー＝アステラス	60.90	先発・代表薬
後	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	20mg1錠	第一三共エスファ	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「EE」	20mg1錠	エルメッドエーザイ	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「FFP」	20mg1錠	富士フィルムファーマ＝共創未来ファーマ	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「JG」	20mg1錠	日本ジェネリック	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「KN」	20mg1錠	小林化工	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「NPI」	20mg1錠	日本薬工＝日新製薬	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「TCK」	20mg1錠	辰巳	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「YD」	20mg1錠	陽進堂	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「オーハラ」	20mg1錠	大原	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「杏林」	20mg1錠	キョーリンリメディオ＝杏林	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「ケミファ」	20mg1錠	ケミファ	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「サワイ」	20mg1錠	沢井	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「サンド」	20mg1錠	サンド	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「三和」	20mg1錠	三和化学	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「武田テバ」	20mg1錠	武田テバ薬品＝武田テバファーマ＝武田	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「タナベ」	20mg1錠	田辺三菱＝田辺販売	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「ツルハラ」	20mg1錠	鶴原	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「トーワ」	20mg1錠	東和薬品	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「日医工」	20mg1錠	日医工	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「ニプロ」	20mg1錠	ニプロ	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「ファイザー」	20mg1錠	ダイト＝ファイザー	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠20mg「明治」	20mg1錠	MeijiSeika	24.40	H29.6.16収載
後	テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」	20mg1錠	沢井	24.40	H29.6.16収載／先発・代表薬に同一規格の口腔崩壊錠なし
後	テルミサルタンOD錠20mg「トーワ」	20mg1錠	東和薬品	24.40	H29.6.16収載／＼
	ミカルディス錠40mg	40mg1錠	日本ベーリンガー＝アステラス	115.00	先発・代表薬
後	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	40mg1錠	第一三共エスファ	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「EE」	40mg1錠	エルメッドエーザイ	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「FFP」	40mg1錠	富士フィルムファーマ＝共創未来ファーマ	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「JG」	40mg1錠	日本ジェネリック	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「KN」	40mg1錠	小林化工	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「NPI」	40mg1錠	日本薬工＝日新製薬	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「TCK」	40mg1錠	辰巳	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「YD」	40mg1錠	陽進堂	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「オーハラ」	40mg1錠	大原	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「杏林」	40mg1錠	キョーリンリメディオ＝杏林	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「ケミファ」	40mg1錠	ケミファ	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「サワイ」	40mg1錠	沢井	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「サンド」	40mg1錠	サンド	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「三和」	40mg1錠	三和化学	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「武田テバ」	40mg1錠	武田テバ薬品＝武田テバファーマ＝武田	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「タナベ」	40mg1錠	田辺三菱＝田辺販売	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「ツルハラ」	40mg1錠	鶴原	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「トーワ」	40mg1錠	東和薬品	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「日医工」	40mg1錠	日医工	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「ニプロ」	40mg1錠	ニプロ	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「ファイザー」	40mg1錠	ダイト＝ファイザー	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠40mg「明治」	40mg1錠	MeijiSeika	46.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」	40mg1錠	沢井	46.00	H29.6.16収載／先発・代表薬に同一規格の口腔崩壊錠なし
後	テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	40mg1錠	東和薬品	46.00	H29.6.16収載／＼
	ミカルディス錠80mg	80mg1錠	日本ベーリンガー＝アステラス	174.80	先発・代表薬
後	テルミサルタン錠80mg「DSEP」	80mg1錠	第一三共エスファ	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「EE」	80mg1錠	エルメッドエーザイ	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「FFP」	80mg1錠	富士フィルムファーマ＝共創未来ファーマ	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「JG」	80mg1錠	日本ジェネリック	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「KN」	80mg1錠	小林化工	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「NPI」	80mg1錠	日本薬工＝日新製薬	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「TCK」	80mg1錠	辰巳	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「YD」	80mg1錠	陽進堂	69.00	H29.6.16収載

(つづく)

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

(テルミサルタンのつづき)

後	テルミサルタン錠80mg「オーハラ」	80mg1錠	大原	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「杏林」	80mg1錠	キョーリンリメディオ＝杏林	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「ケミファ」	80mg1錠	ケミファ	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「サワイ」	80mg1錠	沢井	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「サンド」	80mg1錠	サンド	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「三和」	80mg1錠	三和化学	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「武田テバ」	80mg1錠	武田テバ薬品＝武田テバファーマ＝武田	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「タナベ」	80mg1錠	田辺三菱＝田辺販売	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「ツルハラ」	80mg1錠	鶴原	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「トーワ」	80mg1錠	東和薬品	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「日医工」	80mg1錠	日医工	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「ニプロ」	80mg1錠	ニプロ	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「ファイザー」	80mg1錠	ダイト＝ファイザー	69.00	H29.6.16収載
後	テルミサルタン錠80mg「明治」	80mg1錠	MeijiSeika	69.00	H29.6.16収載

【適応】高血圧症。【用法】1日1回40mg。1日20mgから開始し漸増。1日最大80mg。

2149i ベタキソロール塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ケルロング錠5mg	5mg1錠	サノフィ	62.70	先発・代表薬
後	ベタキソロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	5mg1錠	東和薬品	25.00	H29.6.16収載
	ケルロング錠10mg	10mg1錠	サノフィ	120.10	先発・代表薬
後	ベタキソロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	10mg1錠	東和薬品	45.30	H29.6.16収載

【適応】①本態性高血圧症(軽症～中等症)。②腎実質性高血圧症。③狭心症。【用法】①1日1回5～10mg。最高量1日1回20mg。②1日1回5mg。最高量1日1回10mg。③1日1回10mg。最高量1日1回20mg。

2149i マニジピン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	カルスロット錠5	5mg1錠	武田テバ薬品＝武田	21.10	先発・代表薬
後	マニジピン塩酸塩錠5mg「トーワ」	5mg1錠	東和薬品	9.90	H29.6.16収載
	カルスロット錠10	10mg1錠	武田テバ薬品＝武田	31.60	先発・代表薬
後	マニジピン塩酸塩錠10mg「トーワ」	10mg1錠	東和薬品	12.90	H29.6.16収載
	カルスロット錠20	20mg1錠	武田テバ薬品＝武田	62.40	先発・代表薬
後	マニジピン塩酸塩錠20mg「トーワ」	20mg1錠	東和薬品	23.20	H29.6.16収載

【適応】高血圧症。【用法】1回10～20mg。1日1回。朝食後。1日5mgから開始。必要に応じ漸増。

2149T カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ユニシア配合錠LD	1錠	武田テバ薬品＝武田	125.60	先発・代表薬
後	カムシア配合錠LD「トーワ」	1錠	東和薬品	62.10	H29.6.16収載
	ユニシア配合錠HD	1錠	武田テバ薬品＝武田	125.60	先発・代表薬
後	カムシア配合錠HD「トーワ」	1錠	東和薬品	62.10	H29.6.16収載

【適応】高血圧症。【用法】1日1回1錠。高血圧治療の第一選択薬としての使用不可。

2149T テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ミカムロ配合錠AP	1錠	日本ベーリンガー＝アステラス	117.40	先発・代表薬
後	テラムロ配合錠AP「DSEP」	1錠	第一三共エスファ	58.70	H29.6.16収載
後	テラムロ配合錠AP「EE」	1錠	ニプロファーマ＝エルメッドエーザイ	58.70	H29.6.16収載
後	テラムロ配合錠AP「サワイ」	1錠	沢井	58.70	H29.6.16収載
後	テラムロ配合錠AP「武田テバ」	1錠	武田テバファーマ＝武田	58.70	H29.6.16収載
後	テラムロ配合錠AP「トーワ」	1錠	東和薬品	58.70	H29.6.16収載
後	テラムロ配合錠AP「日医工」	1錠	日医工	58.70	H29.6.16収載
後	テラムロ配合錠AP「ニプロ」	1錠	ニプロ	58.70	H29.6.16収載
	ミカムロ配合錠BP	1錠	日本ベーリンガー＝アステラス	178.10	先発・代表薬
後	テラムロ配合錠BP「DSEP」	1錠	第一三共エスファ	89.10	H29.6.16収載
後	テラムロ配合錠BP「EE」	1錠	ニプロファーマ＝エルメッドエーザイ	89.10	H29.6.16収載
後	テラムロ配合錠BP「サワイ」	1錠	沢井	89.10	H29.6.16収載
後	テラムロ配合錠BP「武田テバ」	1錠	武田テバファーマ＝武田	89.10	H29.6.16収載
後	テラムロ配合錠BP「トーワ」	1錠	東和薬品	89.10	H29.6.16収載
後	テラムロ配合錠BP「日医工」	1錠	日医工	89.10	H29.6.16収載
後	テラムロ配合錠BP「ニプロ」	1錠	ニプロ	89.10	H29.6.16収載

【適応】高血圧症。【用法】1日1回1錠。高血圧治療の第一選択薬としての使用不可。

2149T テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ミコンビ配合錠AP	1錠	日本ベーリンガー＝アステラス	122.30	先発・代表薬
後	テルチア配合錠AP「DSEP」	1錠	第一三共エスファ	61.20	H29.6.16収載
後	テルチア配合錠AP「サワイ」	1錠	沢井	61.20	H29.6.16収載
後	テルチア配合錠AP「武田テバ」	1錠	武田テバファーマ＝武田	61.20	H29.6.16収載
後	テルチア配合錠AP「トーフ」	1錠	東和薬品＝ニプロ	61.20	H29.6.16収載
後	テルチア配合錠AP「日医工」	1錠	日医工	61.20	H29.6.16収載
	ミコンビ配合錠BP	1錠	日本ベーリンガー＝アステラス	178.90	先発・代表薬
後	テルチア配合錠BP「DSEP」	1錠	第一三共エスファ	89.50	H29.6.16収載
後	テルチア配合錠BP「サワイ」	1錠	沢井	89.50	H29.6.16収載
後	テルチア配合錠BP「武田テバ」	1錠	武田テバファーマ＝武田	89.50	H29.6.16収載
後	テルチア配合錠BP「トーフ」	1錠	東和薬品＝ニプロ	89.50	H29.6.16収載
後	テルチア配合錠BP「日医工」	1錠	日医工	89.50	H29.6.16収載

【適応】高血圧症。【用法】1日1回1錠。高血圧治療の第一選択薬としての使用不可。

2149T バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	エックスフォーージ配合OD錠	1錠	ノバルティス	105.50	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	アムバロ配合OD錠「トーフ」	1錠	東和薬品	43.70	H29.6.16収載／口腔崩壊錠

【適応】高血圧症。【用法】1日1回1錠。高血圧治療の第一選択薬としての使用不可。

2160i リザトリブタン安息香酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	マクスルトRPD錠10mg	10mg1錠	杏林＝エーザイ	945.10	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	リザトリブタンOD錠10mg「TCK」	10mg1錠	辰巳	382.20	H29.6.16収載／口腔崩壊錠
後	リザトリブタンOD錠10mg「アメル」	10mg1錠	共和薬品	382.20	H29.6.16収載／
後	リザトリブタンOD錠10mg「トーフ」	10mg1錠	東和薬品	382.20	H29.6.16収載／
後	リザトリブタンOD錠10mg「ファイザー」	10mg1錠	ファイザー	382.20	H29.6.16収載／

【適応】片頭痛。【用法】リザトリブタンとして1回10mg。頭痛発現時。効果不十分時は2時間以上あけた後追加投与可。1日総量20mg以内。

2171 硝酸イソソルビド

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	フランドル錠20mg	20mg1錠	トーアエイヨー＝アステラス	14.70	先発・代表薬
後	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーフ」	20mg1錠	東和薬品	5.80	H29.6.16収載

【適応】狭心症。急性期を除く心筋梗塞、その他の虚血性心疾患。【用法】1回20mg、1日2回。

2171 ニコランジル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	シグマート錠2.5mg	2.5mg1錠	中外	14.00	先発・代表薬
後	ニコランジル錠2.5mg「トーフ」	2.5mg1錠	東和薬品	5.60	H29.6.16収載
	シグマート錠5mg	5mg1錠	中外	21.20	先発・代表薬
後	ニコランジル錠5mg「トーフ」	5mg1錠	東和薬品＝ケミファ＝田辺三菱＝田辺販売	6.60	H29.6.16収載

【適応】狭心症。【用法】1日15mg、分3。

2189i ピタバスタチンカルシウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	リバロOD錠4mg	4mg1錠	興和＝興和創薬	207.60	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「日医工」	4mg1錠	日医工	90.90	H29.6.16収載／口腔崩壊錠

【適応】①高コレステロール血症。②家族性高コレステロール血症。【用法】1日1回1～2mg。LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合、1日最大4mgまで増量可。

2189i ロスバスタチンカルシウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	クレストール錠2.5mg	2.5mg1錠	アストラゼネカ＝塩野義	63.10	先発・代表薬
後	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	2.5mg1錠	第一三共エスファ	31.60	H29.6.16収載
	クレストール錠5mg	5mg1錠	アストラゼネカ＝塩野義	121.30	先発・代表薬
後	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	5mg1錠	第一三共エスファ	60.70	H29.6.16収載

【適応】高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症。【用法】ロスバスタチンとして1日1回2.5mgより開始。早期にLDL-コレステロール値の低下が必要な場合、5mgより開始可。開始後又は増量後、4週以降にLDL-コレステロール値の低下が不十分な場合、10mgまで漸増可。10mgでもLDL-コレステロール値の低下が不十分な家族性高コレステロール血症患者などの重症患者に限りさらに増量可。1日最大20mg。

2190i トコフェロールニコチン酸エステル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ユベラNカプセル100mg	100mg1カプセル	エーザイ	5.80	先発・代表薬
後	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」	100mg1カプセル	東和薬品	5.40	H29.6.16収載

【適応】高脂質血症。高血圧症に伴う随伴症状。閉塞性動脈硬化症に伴う末梢循環障害。【用法】1日300～600mg、分3。

2234 ブロムヘキシシン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ビソルボン錠4mg	4mg1錠	日本ベーリンガー	5.70	先発・代表薬
後	ブロムヘキシシン塩酸塩錠4mg「トーフ」	4mg1錠	東和薬品	5.00	H29.6.16収載
後	ブロムヘキシシン塩酸塩シロップ0.08%「トーフ」	0.08%1mL	東和薬品	1.10	H29.6.16収載／先発・代表薬に同一剤形なし

【適応】次の疾患の去痰／急性気管支炎、慢性気管支炎、肺結核、塵肺症、手術後。【用法】1回4mg(0.08%シロップ:5mL)、1日3回。

2325 ニザチジン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	③	備考
	アシノン錠75mg	75mg1錠	ゼリア	20.90	○	○	○	先発・代表薬
後	ニザチジンカプセル75mg「トーフ」	75mg1カプセル	東和薬品	15.20	○	○	○	H29.6.16収載／先発・代表薬に同一剤形なし
	アシノン錠150mg	150mg1錠	ゼリア	33.00	○	○	—	先発・代表薬
後	ニザチジンカプセル150mg「トーフ」	150mg1カプセル	東和薬品	23.10	○	○	—	H29.6.16収載／先発・代表薬に同一剤形なし

【適応】①胃潰瘍、十二指腸潰瘍。②逆流性食道炎。③次の疾患の胃粘膜病変(びらん、出血、発赤、浮腫)の改善／急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期。⇒(③は75mg製剤のみ)【用法】①1回150mg、1日2回朝食後、就寝前。1日1回300mg、就寝前も可。②1回150mg、1日2回朝食後、就寝前。③1回75mg、1日2回朝食後、就寝前。

2329i オメプラゾール

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	③	④	備考
	オメプラゾン錠10mg	10mg1錠	田辺三菱	75.00	○	○	○	○	先発・代表薬
	オメプラール錠10	10mg1錠	アストラゼネカ	74.70	○	○	○	○	先発・代表薬
後	オメプラゾール錠10mg「MED」	10mg1錠	沢井＝日本ジェネリック	39.20	○	○	○	○	H29.6.16収載
後	オメプラゾール腸溶錠10mg「武田テバ」	10mg1錠	武田テバファーマ＝武田	31.80	○	○	○	○	H29.6.16収載
	オメプラール錠20	20mg1錠	アストラゼネカ	128.90	○	○	○	—	先発・代表薬
	オメプラゾン錠20mg	20mg1錠	田辺三菱	128.30	○	○	○	—	先発・代表薬
後	オメプラゾール錠20mg「MED」	20mg1錠	沢井＝日本ジェネリック	65.60	○	○	○	—	H29.6.16収載
後	オメプラゾール腸溶錠20mg「武田テバ」	20mg1錠	武田テバファーマ＝武田	49.30	○	○	○	—	H29.6.16収載

【適応】①胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、Zollinger-Ellison症候群。②逆流性食道炎。③次におけるヘリコバクター・ピロリの除菌の補助／胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎。④非びらん性胃食道逆流症。⇒(④は10mg製剤のみ)【用法】①1日1回20mg。胃潰瘍、吻合部潰瘍は8週間まで。十二指腸潰瘍は6週間まで。②1日1回20mg。投与は8週間まで。再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法は1日1回10～20mg。③1回20mg、アモキシシリン水和物1回750mg、クラリスロマイシン1回200mgの3剤を同時に1日2回、7日間。クラリスロマイシンは1回400mg、1日2回まで増量可。前記の3剤による除菌治療が不成功の場合、代替治療として1回20mg、アモキシシリン水和物1回750mg、メロニダゾール1回250mgの3剤を同時に1日2回、7日間。④1日1回10mg。投与は4週間まで。

2329i レバミピド

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ムコスタ錠100mg	100mg1錠	大塚製薬	14.60	先発・代表薬
後	レバミピド錠100mg「オーツカ」	100mg1錠	大塚工場＝大塚製薬	9.90	H29.6.16収載

【適応】①胃潰瘍。②次の疾患の胃粘膜病変(びらん、出血、発赤、浮腫)の改善／急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期。【用法】①1回100mg、1日3回朝、夕及び就寝前。②1回100mg、1日3回。

2399i メサラジン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	備考
	アサコール錠400mg	400mg1錠	ゼリア＝協和発酵キリン	76.20	○	先発・代表薬
後	メサラジン腸溶錠400mg「F」	400mg1錠	富士製薬	44.60	△	H29.6.16収載
後	メサラジン腸溶錠400mg「KN」	400mg1錠	小林化工＝堀井	44.60	△	H29.6.16収載

【適応】①潰瘍性大腸炎(重症を除く)。【用法】①1日2、400mg、分3。寛解期は必要に応じて1日1回2、400mgも可(アサコールのみ)。活動期は1日3、600mg、分3。※△は寛解期の1日1回用法がないことを示す。

2478 メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	プロベラ錠2.5mg	2.5mg1錠	ファイザー	26.40	先発・代表薬
後	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠	東和薬品	8.70	H29.6.16収載

【適応】無月経、月経周期異常(稀発月経、多発月経)、月経量異常(過少月経、過多月経)、機能性子宮出血、黄体機能不全による不妊症、切迫流早産、習慣性流早産。【用法】1日2、5～15mg、分1～3。

2499i ジエノゲスト

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	備考
	ディナゲスト錠1mg	1mg1錠	持田	475.50	○	○	先発・代表薬
後	ジエノゲスト錠1mg「F」	1mg1錠	富士製薬	198.10	○	—	H29.6.16収載
後	ジエノゲスト錠1mg「JG」	1mg1錠	日本ジェネリック	198.10	○	—	H29.6.16収載
後	ジエノゲスト錠1mg「KN」	1mg1錠	小林化工＝あすか製薬＝武田	198.10	○	—	H29.6.16収載
後	ジエノゲスト錠1mg「MYL」	1mg1錠	ニプロファーマ＝マイランEPD	198.10	○	—	H29.6.16収載
後	ジエノゲスト錠1mg「SUN」	1mg1錠	サンファーマ	198.10	○	—	H29.6.16収載
後	ジエノゲスト錠1mg「キッセイ」	1mg1錠	ジェイドルフ＝キッセイ	198.10	○	—	H29.6.16収載
後	ジエノゲスト錠1mg「サワイ」	1mg1錠	沢井	198.10	○	—	H29.6.16収載
後	ジエノゲスト錠1mg「トーワ」	1mg1錠	東和薬品	198.10	○	—	H29.6.16収載
後	ジエノゲスト錠1mg「ニプロ」	1mg1錠	ニプロ	198.10	○	—	H29.6.16収載
後	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg1錠	持田販売	198.10	○	—	H29.6.16収載
	ディナゲストOD錠1mg	1mg1錠	持田	475.50	○	○	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	ジエノゲストOD錠1mg「KN」	1mg1錠	小林化工＝あすか製薬＝武田	198.10	○	—	H29.6.16収載／口腔崩壊錠
後	ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	1mg1錠	持田販売	198.10	○	—	H29.6.16収載／

【適応】①子宮内膜症。②子宮腺筋症に伴う疼痛の改善。⇒(②はディナゲストのみ)【用法】①②1日2mg、月経周期2～5日目より分2。

2590i プロピベリン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	パップフォー錠10	10mg1錠	大鵬薬品	63.60	先発・代表薬
後	プロピベリン塩酸塩錠10mg「MED」	10mg1錠	メディサ＝沢井＝旭化成ファーマ	35.60	H29.6.16収載
後	プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」	10mg1錠	東和薬品	35.60	H29.6.16収載
	パップフォー錠20	20mg1錠	大鵬薬品	109.80	先発・代表薬
後	プロピベリン塩酸塩錠20mg「MED」	20mg1錠	メディサ＝沢井＝旭化成ファーマ	61.30	H29.6.16収載
後	プロピベリン塩酸塩錠20mg「トーワ」	20mg1錠	東和薬品	45.80	H29.6.16収載

【適応】次の疾患又は状態における頻尿、尿失禁／神経因性膀胱、神経性頻尿、不安定膀胱、膀胱刺激状態(慢性膀胱炎、慢性前立腺炎)。過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁。【用法】1日1回20mg。効果不十分時は1回20mg、1日2回まで増量可。

2900i ガンマオリザノール

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ハイゼット錠50mg	50mg1錠	大塚製薬	10.10	先発・代表薬
後	ガンマオリザノール錠50mg「トーワ」	50mg1錠	東和薬品	5.60	H29.6.16収載

【適応】①高脂血症。②心身症(更年期障害、過敏性腸症候群)における身体症候・不安・緊張・抑うつ。【用法】①1日300mg、分3。②1日10～50mg。過敏性腸症候群には1日50mgまで。

3131 フラビンアデニンジヌクレオチド

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	フラビタン錠5mg	5mg1錠	トーアエイヨー＝アステラス	5.60	先発・代表薬
後	FAD腸溶錠5mg「わかもと」	5mg1錠	わかもと	5.60	H29.6.16収載
	フラビタン錠10mg	10mg1錠	トーアエイヨー＝アステラス	6.80	先発・代表薬
後	FAD腸溶錠10mg「わかもと」	10mg1錠	わかもと	5.60	H29.6.16収載
後	FAD腸溶錠15mg「わかもと」	15mg1錠	わかもと	5.60	H29.6.16収載／先発・代表薬に同一規格なし

【適応】ビタミンB₂欠乏症の予防・治療。ビタミンB₂の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患、妊産婦、授乳婦、激しい肉體労働時等)。次の疾患のうち、ビタミンB₂の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合／口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、肛門周囲びらん、陰部びらん、急性湿疹、慢性湿疹、脂漏性湿疹、ペラグラ、尋常性ざ瘡、酒さ、日光皮膚炎、結膜炎、びまん性表層角膜炎、角膜部周擁充血、角膜脈管新生。【用法】1日5～45mg、分1～3。

3131 リボフラビン酪酸エステル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ハイボン錠20mg	20mg1錠	田辺三菱＝田辺販売	5.60	先発・代表薬
後	リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」	20mg1錠	キョーリンリメディオ＝杏林	5.40	H29.6.16収載

【適応】①ビタミンB₂欠乏症の予防・治療。次の疾患のうち、ビタミンB₂の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合／口角炎、口唇炎、舌炎、脂漏性湿疹、結膜炎、びまん性表層角膜炎。ビタミンB₇の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患、妊産婦、授乳婦、激しい肉體労働時等)。②高コレステロール血症。【用法】①1日5～20mg、分2～3。②1日60～120mg、分2～3。

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

3150 トコフェロール酢酸エステル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ユベラ錠50mg	50mg1錠	サンノーバ=エーザイ	5.60	先発・代表薬
後	トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーフ」	50mg1錠	東和薬品	5.60	H29.6.16収載

【適応】ビタミンE欠乏症の予防・治療、末梢循環障害(間歇性跛行症、動脈硬化症、静脈血栓症、血栓性静脈炎、糖尿病性網膜症、凍瘡、四肢冷感症)、過酸化脂質の増加防止。【用法】1回50~100mg、1日2~3回。

3321 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アドナ錠30mg	30mg1錠	田辺三菱=田辺販売	10.80	先発・代表薬
後	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーフ」	30mg1錠	東和薬品	5.60	H29.6.16収載

【適応】毛細血管抵抗性の減弱・透過性の亢進によると考えられる出血傾向(紫斑病等)。毛細血管抵抗性の減弱による皮膚・粘膜・内膜からの出血、眼底出血・腎出血・子宮出血。毛細血管抵抗性の減弱による手術中・術後の異常出血。【用法】1日30~90mg、分3。

3399i イコサペント酸エチル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	エパデルカプセル300	300mg1カプセル	持田	38.50	先発・代表薬
後	イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーフ」	300mg1カプセル	東和薬品	16.00	H29.6.16収載

【適応】①閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛及び冷感の改善。②高脂血症。【用法】①1回600mg、1日3回毎食直後。②1回600mg、1日3回毎食直後。又は1回900mg、1日2回食直後。トリグリセリドの異常を呈する場合には、その程度により1回900mg、1日3回まで増量可。

3399i ベラプロストナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	プロサイリン錠20	20 μ g1錠	科研	57.10	先発・代表薬
	ドルナー錠20 μ g	20 μ g1錠	東レ=アステラス	56.40	先発・代表薬
後	ベラプロストナトリウム錠20 μ g「日医工」	20 μ g1錠	日医工=ケミファ	21.60	H29.6.16収載
後	ベラプロストナトリウム錠40 μ g「日医工」	40 μ g1錠	日医工	48.10	H29.6.16収載/先発・代表薬に同一規格なし

【適応】①慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍、疼痛及び冷感の改善。②原発性肺高血圧症。【用法】①1日120 μ g、分3。②1日60 μ g、分3より開始。症状(副作用)を観察しながら漸増。増量は投与回数1日3~4回、1日最高180 μ g。

3929i ホリナートカルシウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ユーゼル錠25mg	25mg1錠	大鵬薬品	2,264.90	先発・代表薬
	ロイコボリン錠25mg	25mg1錠	ファイザー	2,229.80	先発・代表薬
後	ホリナート錠25mg「DSEP」	25mg1錠	第一三共エスファ	925.60	H29.6.16収載
後	ホリナート錠25mg「JG」	25mg1錠	日本ジェネリック	925.60	H29.6.16収載
後	ホリナート錠25mg「KCC」	25mg1錠	共和クリティケア	925.60	H29.6.16収載
後	ホリナート錠25mg「NK」	25mg1錠	高田=日本化薬	925.60	H29.6.16収載
後	ホリナート錠25mg「オーハラ」	25mg1錠	大原	925.60	H29.6.16収載
後	ホリナート錠25mg「サワイ」	25mg1錠	沢井	925.60	H29.6.16収載
後	ホリナート錠25mg「武田テバ」	25mg1錠	武田テバファーマ=武田	925.60	H29.6.16収載
後	ホリナート錠25mg「トーフ」	25mg1錠	東和薬品	925.60	H29.6.16収載

【適応】ホリナート・テガフル・ウラシル療法/結腸・直腸癌に対するテガフル・ウラシルの抗腫瘍効果の増強。【用法】ロイコボリンとして1日75mg、テガフル・ウラシル配合剤と同時に分3。テガフル・ウラシル配合剤は1日テガフル300~600mg相当量(基準300mg/m²)、食事の前後1時間を避け分3。これらを28日間連日、その後7日間休薬。これを1クールとして繰り返す。

3943 アロプリノール

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ザイロリック錠50	50mg1錠	GSK	12.70	先発・代表薬
後	アロプリノール錠50mg「タナベ」	50mg1錠	田辺三菱=田辺販売	9.90	H29.6.16収載
	ザイロリック錠100	100mg1錠	GSK	23.10	先発・代表薬
後	アロプリノール錠100mg「タナベ」	100mg1錠	田辺三菱=田辺販売	17.00	H29.6.16収載

【適応】次の場合における高尿酸血症の是正/痛風、高尿酸血症を伴う高血圧症。【用法】1日200~300mg、分2~3。

3969i ミグリトール

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	セイブル錠25mg	25mg1錠	三和化学	30.00	先発・代表薬
後	ミグリトール錠25mg「トーフ」	25mg1錠	東和薬品	11.90	H29.6.16収載
	セイブルOD錠25mg	25mg1錠	三和化学	30.00	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	ミグリトールOD錠25mg「サワイ」	25mg1錠	沢井	11.90	H29.6.16収載／口腔崩壊錠
	セイブル錠50mg	50mg1錠	三和化学	52.40	先発・代表薬
後	ミグリトール錠50mg「トーフ」	50mg1錠	東和薬品	21.10	H29.6.16収載
	セイブルOD錠50mg	50mg1錠	三和化学	52.40	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	50mg1錠	沢井	21.10	H29.6.16収載／口腔崩壊錠
	セイブル錠75mg	75mg1錠	三和化学	73.30	先発・代表薬
後	ミグリトール錠75mg「トーフ」	75mg1錠	東和薬品	26.70	H29.6.16収載
	セイブルOD錠75mg	75mg1錠	三和化学	73.30	先発・代表薬／口腔崩壊錠
後	ミグリトールOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠	沢井	26.70	H29.6.16収載／口腔崩壊錠

【適応】糖尿病の食後過血糖の改善(食事療法・運動療法を行っている患者で十分な効果が得られない場合、又は両療法に加えてSU剤、ビッグuanid系薬剤もしくはインスリン製剤を使用している患者で十分な効果が得られない場合)。【用法】1回50mg、1日3回毎食直前。効果不十分時は1回75mgまで増量可。

3999i ラロキシフェン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	エビスタ錠60mg	60mg1錠	リリー	109.20	先発・代表薬
後	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日医工」	60mg1錠	日医工	61.00	H29.6.16収載
後	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」	60mg1錠	日新製薬＝日本ジェネリック	61.00	H29.6.16収載

【適応】閉経後骨粗鬆症。【用法】1日1回60mg。

4229J テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg1錠(テガフル相当量)	大鵬薬品	564.70	先発・代表薬
後	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20mg1錠(テガフル相当量)	岡山大鵬	279.60	H29.6.16収載／口腔崩壊錠
	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg1錠(テガフル相当量)	大鵬薬品	680.60	先発・代表薬
後	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25mg1錠(テガフル相当量)	岡山大鵬	372.50	H29.6.16収載／口腔崩壊錠

【適応】胃癌、結腸・直腸癌、頭頸部癌、非小細胞肺癌、手術不能又は再発乳癌、膀胱癌、胆道癌。【用法】初回基準量(1回量)、1. 25m²未満40mg、1. 25～1. 5m²未満50mg、1. 5m²以上60mg、朝及び夕食後、1日2回28日間連日。その後14日間休薬。これを1クールとして繰り返す。増減量の段階は1回40mg、50mg、60mg、75mgで1回75mgが限度。減量は1段階ずつ行い、最低投与量は1回40mg。

4413 メキタジン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ゼスラン錠3mg	3mg1錠	旭化成ファーマ	8.20	先発・代表薬
	ニボラジン錠3mg	3mg1錠	アルフレッサファーマ	8.20	先発・代表薬
後	メキタジン錠3mg「トーフ」	3mg1錠	東和薬品	5.60	H29.6.16収載

【適応】①蕁麻疹。皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)。アレルギー性鼻炎。②気管支喘息。【用法】①1回3mg、1日2回。②1回6mg、1日2回。

4419i クレマスチンフマル酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	備考
	タベジールシロップ0.01%	0.01%10mL	GSKCHJ＝ノバルティス	29.20	○	○	先発・代表薬
後	クレマスチンシロップ0.01%「日医工」	0.01%10mL	日医工＝三和化学	16.30	○	○	H29.6.16収載
後	クレマスチンドライシロップ0.1%「日医工」	0.1%1g	日医工＝三和化学	9.40	○	○	H29.6.16収載／先発・代表薬に同一剤形なし
	タベジール錠1mg	1mg1錠	GSKCHJ＝ノバルティス	7.70	○	—	先発・代表薬
後	クレマスチン錠1mg「日医工」	1mg1錠	日医工＝三和化学	5.00	○	—	H29.6.16収載

【適応】①アレルギー性皮膚疾患(蕁麻疹、湿疹、皮膚炎、そう痒症)。アレルギー性鼻炎。②感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽。(⇒②はシロップ・DSのみ)【用法】①②クレマスチンとして〔錠〕1日2mg、分2朝晩。〔シロップ・DS〕成人1日(シロップ)20mL(DS)2g、11～15歳未満(シロップ)13mL(DS)1.3g、8～11歳未満(シロップ)10mL(DS)1g、5～8歳未満(シロップ)7mL(DS)0.7g、3～5歳未満(シロップ)5mL(DS)0.5g、1～3歳未満(シロップ)4mL(DS)0.4g、分2。

4490 ペミロラストカリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アレギサル錠5mg	5mg1錠	田辺三菱=田辺販売	47.00	先発・代表薬
	ペミラスト錠5mg	5mg1錠	アルフレッサファーマ	29.40	先発・代表薬
後	ペミロラストK錠5mg「トーフ」	5mg1錠	東和薬品	19.10	H29.6.16収載
	アレギサル錠10mg	10mg1錠	田辺三菱=田辺販売	79.90	先発・代表薬
	ペミラスト錠10mg	10mg1錠	アルフレッサファーマ	53.50	先発・代表薬
後	ペミロラストK錠10mg「トーフ」	10mg1錠	東和薬品	37.10	H29.6.16収載

【適応】①気管支喘息。②アレルギー性鼻炎。【用法】①1回10mg、1日2回朝・夕食後(又は就寝前)。5~11歳未満は1回5mg、1日2回。②1回5mg、1日2回朝・夕食後(又は就寝前)。

4490 モンテルカストナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	備考
	シングレア細粒4mg	4mg1包	MSD	194.50	○*	—	先発・代表薬
	キプレス細粒4mg	4mg1包	杏林	194.40	○*	—	先発・代表薬
後	モンテルカスト細粒4mg「DSEP」	4mg1包	第一三共エスファ	77.80	○*	—	H29.6.16収載
後	モンテルカスト細粒4mg「JG」	4mg1包	日本ゼネリック	77.80	○*	—	H29.6.16収載
後	モンテルカスト細粒4mg「YD」	4mg1包	陽進堂	77.80	○*	—	H29.6.16収載
後	モンテルカスト細粒4mg「科研」	4mg1包	ダイト=科研	77.80	○*	—	H29.6.16収載
後	モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」	4mg1包	ケミファ=日本薬工	77.80	○*	—	H29.6.16収載
後	モンテルカスト細粒4mg「サワイ」	4mg1包	沢井	77.80	○*	—	H29.6.16収載
後	モンテルカスト細粒4mg「サンド」	4mg1包	サンド	77.80	○*	—	H29.6.16収載
後	モンテルカスト細粒4mg「ゼリア」	4mg1包	日本薬工=ゼリア	77.80	○*	—	H29.6.16収載
後	モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	4mg1包	高田	77.80	○*	—	H29.6.16収載
後	モンテルカスト細粒4mg「武田テバ」	4mg1包	武田テバファーマ=武田	77.80	○*	—	H29.6.16収載
後	モンテルカスト細粒4mg「タナベ」	4mg1包	田辺三菱=田辺販売	77.80	○*	—	H29.6.16収載
後	モンテルカスト細粒4mg「ツルハラ」	4mg1包	鶴原	77.80	○*	—	H29.6.16収載
後	モンテルカスト細粒4mg「トーフ」	4mg1包	東和薬品	77.80	○*	—	H29.6.16収載
後	モンテルカスト細粒4mg「日医工」	4mg1包	日医工	77.80	○*	—	H29.6.16収載
後	モンテルカスト細粒4mg「日新」	4mg1包	日新製薬	77.80	○*	—	H29.6.16収載
後	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」	4mg1包	ニプロ	77.80	○*	—	H29.6.16収載
後	モンテルカスト細粒4mg「ファイザー」	4mg1包	マイラン=ファイザー	77.80	○*	—	H29.6.16収載
後	モンテルカスト細粒4mg「明治」	4mg1包	MeijiSeika	77.80	○*	—	H29.6.16収載
	シングレアチュアブル錠5mg	5mg1錠	MSD	190.90	○**	—	先発・代表薬
	キプレスチュアブル錠5mg	5mg1錠	杏林	190.70	○**	—	先発・代表薬
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「AA」	5mg1錠	浜理=あすか製薬	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「DSEP」	5mg1錠	第一三共エスファ	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「EE」	5mg1錠	エルメッドエーザイ	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「JG」	5mg1錠	日本ゼネリック	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「KN」	5mg1錠	小林化工	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「SN」	5mg1錠	シオノ=江州	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「TCK」	5mg1錠	辰巳	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「YD」	5mg1錠	陽進堂	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「アスペ」	5mg1錠	ホシエヌ=アスペン	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「オーハ」	5mg1錠	大原	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「科研」	5mg1錠	ダイト=科研	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「ケミ」	5mg1錠	ケミファ=日本薬工	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「サワイ」	5mg1錠	沢井	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「サンド」	5mg1錠	サンド	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「三和」	5mg1錠	三和化学	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「ゼリア」	5mg1錠	日本薬工=ゼリア	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	5mg1錠	高田	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「武田テバ」	5mg1錠	武田テバファーマ=武田	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「タナベ」	5mg1錠	田辺三菱=田辺販売	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「トーフ」	5mg1錠	東和薬品	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「日医工」	5mg1錠	日医工	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」	5mg1錠	ニプロ	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「ファイ」	5mg1錠	ファイザー	76.30	○**	—	H29.6.16収載
後	モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	5mg1錠	日新製薬=MeijiSeika	76.30	○**	—	H29.6.16収載
	キプレス錠5mg	5mg1錠	杏林	153.80	○	○	先発・代表薬
	シングレア錠5mg	5mg1錠	MSD	153.20	○	○	先発・代表薬
後	モンテルカスト錠5mg「JG」	5mg1錠	日本ゼネリック	61.40	○	○	H29.6.16収載
後	モンテルカスト錠5mg「ツルハラ」	5mg1錠	鶴原	61.40	○	○	H29.6.16収載
後	モンテルカストナトリウム錠5mg「日本臓器」	5mg1錠	日本臓器	61.40	○	○	H29.6.16収載
後	モンテルカストOD錠5mg「サワイ」	5mg1錠	沢井	61.40	○	○	H29.6.16収載/先発・代表薬に同一規格の口腔崩壊錠なし
後	モンテルカストOD錠5mg「トーフ」	5mg1錠	東和薬品	61.40	○	○	H29.6.16収載//

(つづく)

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

(モンテルカストのつづき)

	キプレス錠10mg	10mg1錠	杏林	203.50	○	○	先発・代表薬
	シングレア錠10mg	10mg1錠	MSD	203.50	○	○	先発・代表薬
後	モンテルカスト錠10mg「JG」	10mg1錠	日本ジェネリック	81.40	○	○	H29.6.16収載
後	モンテルカスト錠10mg「ツルハラ」	10mg1錠	鶴原	81.40	○	○	H29.6.16収載
後	モンテルカストナトリウム錠10mg「日本臓器」	10mg1錠	日本臓器	81.40	○	○	H29.6.16収載
	キプレスOD錠10mg	10mg1錠	杏林	203.50	○	○	先発・代表薬／口腔崩壊錠
	シングレアOD錠10mg	10mg1錠	MSD	203.50	○	○	先発・代表薬／〃
後	モンテルカストOD錠10mg「サワイ」	10mg1錠	沢井	81.40	○	○	H29.6.16収載／口腔崩壊錠
後	モンテルカストOD錠10mg「トーフ」	10mg1錠	東和薬品	81.40	○	○	H29.6.16収載／〃

【適応】①気管支喘息。②アレルギー性鼻炎。⇒(細粒・チュアブル錠：①、その他：①②)【用法】モンテルカストとして〔細粒〕①1～6歳未満の小児1日1回4mg(1包)、就寝前。〔チュアブル錠〕①6歳以上の小児1日1回5mg、就寝前。〔その他〕①成人1日1回10mg、就寝前。②成人1日1回5～10mg、就寝前。※〇*は1～6歳未満の小児、〇**は6歳以上の小児、〇は成人と、用法が異なることを示す。

6132 セフジレン ピボキシル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	メイアクトMS錠100mg	100mg1錠	MeijiSeika	50.60	先発・代表薬
後	セフジレンピボキシル錠100mg「OK」	100mg1錠	大蔵=MeijiSeika	35.30	H29.6.16収載

【適応】<適応菌種>セフジレン感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属、アクネ菌。<適応症>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷・手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、胆のう炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、眼瞼膿瘍、涙のう炎、麦粒腫、瞼板腺炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎。【用法】1回100mg、1日3回食後。重症・効果不十分時は、1回200mg1日3回食後。

6132 セフジニル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	セフゾン細粒小児用10%	100mg1g	アステラス	104.90	先発・代表薬
後	セフジニル細粒小児用10%「トーフ」	100mg1g	東和薬品	64.70	H29.6.16収載
	セフゾンカプセル50mg	50mg1カプセル	アステラス	51.10	先発・代表薬
後	セフジニルカプセル50mg「トーフ」	50mg1カプセル	東和薬品	32.40	H29.6.16収載
	セフゾンカプセル100mg	100mg1カプセル	アステラス	58.60	先発・代表薬
後	セフジニルカプセル100mg「トーフ」	100mg1カプセル	東和薬品	35.70	H29.6.16収載

【適応】<適応菌種>本剤感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、◇淋菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス・ミラビリス、◇プロビデンシア属、インフルエンザ菌、◇ペプトストレプトコッカス属、◇アクネ菌。(細粒は◇を除く)<適応症>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎。⇒(カプセルのみ)外傷・熱傷・手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、尿道炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎。⇒(細粒のみ)猩紅熱。【用法】〔細粒〕小児1日9～18mg/kg(細粒：0.09～0.18g/kg)、分3。〔カプセル〕1回100mg、1日3回。

6149i ロキシシロマイシン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ルリッド錠150	150mg1錠	サノフィ	63.20	先発・代表薬
後	ロキシシロマイシン錠150mg「トーフ」	150mg1錠	東和薬品	36.00	H29.6.16収載

【適応】<適応菌種>本剤感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、アクネ菌、肺炎マイコプラズマ(マイコプラズマ・ニューモニエ)。<適応症>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、ざ瘡(化膿性炎症を伴うもの)、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎。【用法】1日300mg、分2。

6152 ミノサイクリン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ミノマイシン錠50mg	50mg1錠	ファイザー	22.00	先発・代表薬
後	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」	50mg1錠	日医工ファーマ=日医工	14.80	H29.6.16収載
	ミノマイシンカプセル100mg	100mg1カプセル	ファイザー	46.90	先発・代表薬
後	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	100mg1カプセル	日医工ファーマ=日医工	26.80	H29.6.16収載

【適応】<適応菌種>ミノサイクリン感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、淋菌、炭疽菌、大腸菌、赤痢菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、緑膿菌、梅毒トレポネマ、リケッチア属(オリエンチア・ツツガムシ)、クラミジア属、肺炎マイコプラズマ(マイコプラズマ・ニューモニエ)。<適応症>表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷・手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎を含む)、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、精巣上体炎(副睾丸炎)、尿道炎、淋菌感染症、梅毒、腹膜炎、感染性腸炎、外陰炎、細菌性陰炎、子宮内感染、涙のう炎、麦粒腫、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、化膿性唾液腺炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、上顎洞炎、顎炎、炭疽、つつが虫病、オウム病。【用法】成人初回量100～200mg、以後12あるいは24時間ごとに100mg。

6250i アシクロビル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	③	④	備考
	ゾピラックス錠200	200mg1錠	GSK	221.80	○	○	○	○	先発・代表薬
後	アシクロビル内服ゼリー200mg「日医工」	200mg1包	日医工＝武田テバ ファーマ＝武田	173.40	○	○	○	○	H29.6.16 収載／ 先発・代 表薬に同 一剤形な し
後	アシクロビル内服ゼリー800mg「日医工」	800mg1包	日医工＝武田テバ ファーマ＝武田	513.80	-	-	○	-	H29.6.16 収載／ 〃

【適応】①単純疱疹。②造血幹細胞移植における単純ヘルペスウイルス感染症(単純疱疹)の発症抑制。③帯状疱疹。④性器ヘルペスの再発抑制。
⇒(内服ゼリー800mgは③のみ)【用法】①成人1回200mg, 1日5回。小児1回20mg/kg, 1日4回。小児は1回最高200mg。②成人1回200mgを1日5回, 小児1回20mg/kgを1日4回, 骨髄移植施行7日前より施行後35日まで。小児は1回最高200mg。③成人1回800mg, 1日5回。小児1回20mg/kg, 1日4回。小児は1回最高800mg。④小児1回20mg/kg, 1日4回。1回最高200mg。

6250i エンテカビル水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	バラクルード錠0.5mg	0.5mg1錠	BMS	1,061.80	先発・代表薬
後	エンテカビル錠0.5mg「CMX」	0.5mg1錠	ケミックス	363.10	H29.6.16収載
後	エンテカビル錠0.5mg「DSEP」	0.5mg1錠	第一三共エスファ	363.10	H29.6.16収載
後	エンテカビル錠0.5mg「EE」	0.5mg1錠	シオノ＝エルメッドエー ザイ	363.10	H29.6.16収載
後	エンテカビル錠0.5mg「JG」	0.5mg1錠	日本ジェネリック	363.10	H29.6.16収載
後	エンテカビル錠0.5mg「KN」	0.5mg1錠	小林化工	363.10	H29.6.16収載
後	エンテカビル錠0.5mg「YD」	0.5mg1錠	大興＝陽進堂	363.10	H29.6.16収載
後	エンテカビル錠0.5mg「サンド」	0.5mg1錠	サンド	363.10	H29.6.16収載
後	エンテカビル錠0.5mg「タカタ」	0.5mg1錠	高田	363.10	H29.6.16収載
後	エンテカビル錠0.5mg「武田テバ」	0.5mg1錠	武田テバファーマ＝武 田	363.10	H29.6.16収載
後	エンテカビル錠0.5mg「トーフ」	0.5mg1錠	東和薬品	363.10	H29.6.16収載
後	エンテカビル錠0.5mg「ファイザー」	0.5mg1錠	ファイザー	363.10	H29.6.16収載
後	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	沢井	363.10	H29.6.16収載／先発・代表薬に口 腔崩壊錠なし

【適応】B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制。【用法】エンテカビルとして1日1回0.5mg, 空腹時(食後2時間以降かつ次の食事の2時間以上前)。ラムブジン不応患者には, 1日1回1mg推奨。

8119i オキシコドン塩酸塩水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	オキノーム散2.5mg	2.5mg1包	塩野義	67.10	先発・代表薬
	オキノーム散5mg	5mg1包	塩野義	134.10	先発・代表薬
	オキノーム散10mg	10mg1包	塩野義	268.30	先発・代表薬
	オキノーム散20mg	20mg1包	塩野義	536.50	先発・代表薬
後	オキシコドン錠2.5mg「第一三共」	2.5mg1錠	第一三共プロファーマ ＝第一三共	55.40	H29.6.16収載／先発・代表薬に同 一剤形なし
後	オキシコドン錠5mg「第一三共」	5mg1錠	第一三共プロファーマ ＝第一三共	101.80	H29.6.16収載／〃
後	オキシコドン錠10mg「第一三共」	10mg1錠	第一三共プロファーマ ＝第一三共	187.20	H29.6.16収載／〃
後	オキシコドン錠20mg「第一三共」	20mg1錠	第一三共プロファーマ ＝第一三共	344.60	H29.6.16収載／〃

【適応】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛。【用法】オキシコドン塩酸塩として1日10～80mg, 分4。

以 上

薬効・薬価リスト平成29年版 追補情報(平成29年6月)

II. ジェネリック(後発医薬品)とそれに対応する先発・代表薬一覧表(外用薬)

平成29年6月15日告示(16日適用)品目における診療報酬上の後発医薬品と、それに対応する先発・代表薬をまとめています(平成29年7月3日現在, 入手できた情報による)。
 薬効分類・成分名別に掲載しています。
 商品名の左に「後」とあるものが, 診療報酬上の後発医薬品です。
 背景色 \square が, 先発・代表薬を指します(便宜的に後発医薬品等を選択している場合があります)。
 成分内において, 適応や用法に違いがあり, かつ簡便に記号で分類できる場合, 薬価欄の右に対応する番号とともに表記しました。記号は
 ○: 適応ないし用法あり
 △: 適応ないし用法を持つが, 一部に違いあり
 -: 適応・用法なし
 を使用しています。これらはあくまで簡便な分類ですので, 各成分別表記末尾の適応・用法表記とあわせてご覧ください。
 また一覧は対象品目を抜粋したもので, 必ずしも同成分の品目全てに当てはまりません。さらに, 作成時の情報から更新・変更されている場合がありますので, 処方・調剤にあたっては必ず最新の添付文書をご確認ください。

1214 リドカイン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	③	備考
	ペンレステープ18mg	(18mg) 30. 5mm×50. 0mm1枚	日東電工=マルホ	45.40	○	○	○	先発・代表薬
後	リドカインテープ18mg「YP」	(18mg) 30. 5mm×50. 0mm1枚	祐徳=メディキット	33.80	○	○	-	H29.6.16収載

【適応】①静脈留置針穿刺時の疼痛緩和。②伝染性軟属腫摘除時の疼痛緩和。③皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和。⇒(③はペンレスのみ)
 【用法】①1回1枚, 静脈留置針穿刺予定部位に約30分間貼付, 除去後直ちに穿刺。②小児1回2枚まで, 摘除予定部位に約1時間貼付。③成人1回6枚まで, 小児1回3歳以下2枚, 4~5歳3枚, 6~7歳4枚, 8~9歳5枚, 10歳以上6枚まで, レーザー照射予定部位に約1時間貼付。

1315 フルオロメロン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	フルメロン点眼液0. 02%	0. 02%1mL	参天	39.50	先発・代表薬
後	フルオロメロン点眼液0. 02%「わかもと」	0. 02%1mL	わかもと	17.60	H29.6.16収載

【適応】外眼部の炎症性疾患(眼瞼炎, 結膜炎, 角膜炎, 強膜炎, 上強膜炎等)。【用法】1回1~2滴, 1日2~4回。

1319i クロモグリク酸ナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	インタール点眼液2%	100mg5mL1瓶	サノフィ	653.30	先発・代表薬
後	クロモグリク酸Na点眼液2%「わかもと」	100mg5mL1瓶	わかもと	381.00	H29.6.16収載

【適応】アレルギー性結膜炎, 春季カタル。【用法】1回1~2滴, 1日4回(朝昼夕及び就寝前)。

1319i シアノコバラミン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	サンコバ点眼液0. 02%	0. 02%5mL1瓶	参天	87.60	先発・代表薬
後	シアノコバラミン点眼液0. 02%「杏林」	0. 02%5mL1瓶	キョーリンリメディオ=杏林=日本ジェネリック	84.80	H29.6.16収載

【適応】調節性眼精疲労における微動調節の改善。【用法】1回1~2滴, 1日3~5回。

1319i ノルフロキサシン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	バクシダール点眼液0. 3%	0. 3%1mL	杏林=千寿=武田	109.30	先発・代表薬
	ノフロ点眼液0. 3%	0. 3%1mL	日医工	108.60	先発・代表薬
後	ノルフロキサシン点眼液0. 3%「わかもと」	0. 3%1mL	わかもと	63.70	H29.6.16収載

【適応】<適応菌種>本剤感性のブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 腸球菌属, ミクロコッカス属, モラクセラ属, コリネバクテリウム属, バシラス属, クレブシエラ属, エンテロバクター属, セラチア属, プロテウス属, インフルエンザ菌, ヘモフィルス・エジプチウス(コッホ・ウィークス菌), シュードモナス属, 緑膿菌, パークホルデリア・セバシア, ステプトロホモナス(ザントモナス)・マ尔特フィリア, アシネトバクター属, フラボバクテリウム属, アルカリゲネス属。<適応症>眼瞼炎, 涙のう炎, 麦粒腫, 結膜炎, 瞼板腺炎, 角膜炎(角膜潰瘍を含む), 眼科周術期の無菌化療法。【用法】1回1滴, 1日3回。

1319J ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ザラクム配合点眼液	1mL	ファイザー	1,141.40	先発・代表薬
後	ラタチモ配合点眼液「センジュ」	1mL	千寿=武田	570.70	H29.6.16収載
後	ラタチモ配合点眼液「ニッテン」	1mL	ニッテン=日本点眼薬	570.70	H29.6.16収載
後	ラタチモ配合点眼液「ニットー」	1mL	東亜薬品=日東メディック	570.70	H29.6.16収載

【適応】緑内障, 高眼圧症。【用法】1日1回1滴。

1329i オフロキサシン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	タリビッド耳科用液0.3%	3mg1mL	第一三共	109.20	先発・代表薬
後	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	3mg1mL	セオリア＝武田	76.40	H29.6.16収載

【適応】<適応菌種>本剤感性的ブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロピデンシア属、インフルエンザ菌、緑膿菌。<適応症>外耳炎、中耳炎。【用法】1回6～10滴、1日2回。点耳後約10分間の耳浴。小児は適宜滴数を減らす。

2259i ツロブテロール

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ホクナリンテープ0.5mg	0.5mg1枚	マイランEPD＝マルホ	38.90	先発・代表薬
後	ツロブテロールテープ0.5mg「トーフ」	0.5mg1枚	東和薬品＝高田	24.90	H29.6.16収載
	ホクナリンテープ1mg	1mg1枚	マイランEPD＝マルホ	53.20	先発・代表薬
後	ツロブテロールテープ1mg「トーフ」	1mg1枚	東和薬品＝高田	34.90	H29.6.16収載
	ホクナリンテープ2mg	2mg1枚	マイランEPD＝マルホ	73.80	先発・代表薬
後	ツロブテロールテープ2mg「トーフ」	2mg1枚	東和薬品＝高田	45.40	H29.6.16収載

【適応】次の疾患の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難等諸症状の緩解／気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管支炎、肺炎腫。【用法】成人2mg、小児0.5～3歳未満0.5mg、3～9歳未満1mg、9歳以上2mg、1日1回胸部、背部又は上腕部のいずれかに貼付。

2646 ベタメタゾン吉草酸エステル

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ベトネベート軟膏0.12%	0.12%1g	GSK＝第一三共	28.60	先発・代表薬
	リンデロン-V軟膏0.12%	0.12%1g	塩野義	27.40	先発・代表薬
後	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%	0.12%1g	東和薬品	9.20	H29.6.16収載

【適応】湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、女子顔面黒皮症、ピダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を含む)、皮膚そう痒症、痒疹群(蕁麻疹様苔癬、ストロフルス、固定蕁麻疹を含む)、虫さされ、乾癬、掌蹠膿疱症、扁平苔癬、光沢苔癬、毛孔性紅色粗糠疹、ジベルバラ色粗糠疹、紅斑症(多形滲出性紅斑、結節性紅斑、ダリエ遠心性環状紅斑)、紅皮症(悪性リンパ腫による紅皮症を含む)、慢性円板状エリテマトーデス、薬疹・中毒疹、円形脱毛症(悪性を含む)、熱傷(瘢痕・ケロイドを含む)、凍瘡、天疱瘡群、ジューリング疱疹状皮膚炎(類天疱瘡を含む)、痔核、鼓室形成手術・内耳開窓術・中耳根治手術の術創。【用法】1日1～数回、塗布。

2649A ヘパリン類似物質

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	備考
	ヒルドイドゲル0.3%	1g	マルホ	13.60	△	先発・代表薬
後	ヘパリン類似物質ゲル0.3%「トーフ」	1g	東和薬品	6.40	○	H29.6.16収載

【適応】①外傷(打撲、捻挫、挫傷)後の腫脹・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎、血栓性静脈炎⇒(ヘパリン類似物質ゲル0.3%「トーフ」は痔核を含む)、血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患(注射後の硬結・疼痛)、凍瘡、肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と予防、進行性指掌角皮症、筋性斜頸(乳児期)。【用法】①1日1～数回、塗擦、貼付。 ※△は効能が一部異なることを示す。

2649i ケトプロフェン

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	モーラステープ20mg	7cm×10cm1枚	久光＝祐徳	26.20	先発・代表薬
後	ケトプロフェンテープ20mg「トーフ」	7cm×10cm1枚	東和薬品	12.10	H29.6.16収載
	モーラステープL40mg	10cm×14cm1枚	久光＝祐徳	40.10	先発・代表薬
後	ケトプロフェンテープ40mg「トーフ」	10cm×14cm1枚	東和薬品	16.80	H29.6.16収載

【適応】関節リウマチにおける関節局所の鎮痛。次の疾患・症状の鎮痛・消炎／腰痛症(筋・筋膜性腰痛症、変形性脊椎症、椎間板症、腰椎捻挫)、変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎(テニス肘等)、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛。【用法】1日1回、貼付。

2649i ロキソプロフェンナトリウム水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ロキソニンテープ50mg	7cm×10cm1枚	リードケミカル＝第一三共	24.70	先発・代表薬
後	ロキソプロフェンNaテープ50mg「QQ」	7cm×10cm1枚	救急	14.70	H29.6.16収載
	ロキソニンパップ100mg	10cm×14cm1枚	リードケミカル＝第一三共	37.90	先発・代表薬
後	ロキソプロフェンNaパップ100mg「QQ」	10cm×14cm1枚	救急	22.70	H29.6.16収載
	ロキソニンテープ100mg	10cm×14cm1枚	リードケミカル＝第一三共	37.90	先発・代表薬
後	ロキソプロフェンNaテープ100mg「QQ」	10cm×14cm1枚	救急	22.70	H29.6.16収載

【適応】次の疾患・症状の消炎・鎮痛／変形性関節症、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛。【用法】1日1回、貼付。

以 上

薬効・薬価リスト平成29年版 追補情報(平成29年6月)

III. ジェネリック(後発医薬品)とそれに対応する先発・代表薬一覧表(注射薬)

平成29年6月15日告示(16日適用)品目における診療報酬上の後発医薬品と、それに対応する先発・代表薬をまとめています(平成29年7月3日現在, 入手できた情報による)。
 薬効分類・成分名別に掲載しています。
 商品名の左に「後」とあるものが, 診療報酬上の後発医薬品です。
 背景色 \square が, 先発・代表薬を指します(便宜的に後発医薬品等を選択している場合があります)。
 成分内において, 適応や用法に違いがあり, かつ簡便に記号で分類できる場合, 薬価欄の右に対応する番号とともに表記しました。記号は
 ○: 適応ないし用法あり
 △: 適応ないし用法を持つが, 一部に違いあり
 -: 適応・用法なし
 を使用しています。これらはあくまで簡便な分類ですので, 各成分別表記末尾の適応・用法表記とあわせてご覧ください。
 また一覧は対象品目を抜粋したもので, 必ずしも同成分の品目全てに当てはまりません。さらに, 作成時の情報から更新・変更されている場合がありますので, 処方・調剤にあたっては必ず最新の添付文書をご確認ください。

1179i ハロペリドール

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	セレネース注5mg	0.5%1mL1管	大日本住友	89.00	先発・代表薬
後	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	0.5%1mL1管	田辺三菱吉富薬品	56.00	H29.6.16収載

【適応】統合失調症, 躁病。【用法】1回5mg(1A), 1日1~2回静注又は筋注。

1229i ロクロニウム臭化物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	エスラックス静注25mg/2.5mL	25mg2.5mL1瓶	MSD	604.00	先発・代表薬
後	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「F」	25mg2.5mL1瓶	富士製薬	244.00	H29.6.16収載
後	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「マルイシ」	25mg2.5mL1瓶	丸石	244.00	H29.6.16収載
	エスラックス静注50mg/5.0mL	50mg5mL1瓶	MSD	1,080.00	先発・代表薬
後	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	50mg5mL1瓶	富士製薬	437.00	H29.6.16収載
後	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	50mg5mL1瓶	丸石	437.00	H29.6.16収載

【適応】麻酔時の筋弛緩, 気管挿管時の筋弛緩。【用法】挿管量0.6mg/kg, 静注。術中必要により0.1~0.2mg/kg, 追加。持続注入により投与する場合, 7 μ g/kg/分で開始。挿管量の上限0.9mg/kg。

2171 ジルチアゼム塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ヘルベッサ一注射用10	10mg1瓶	田辺三菱	381.00	先発・代表薬
後	ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	10mg1管	日医工ファーマ=日医工	138.00	H29.6.16収載/先発・代表薬に同一剤形なし
	ヘルベッサ一注射用50	50mg1瓶	田辺三菱	1,276.00	先発・代表薬
後	ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	50mg1管	日医工ファーマ=日医工	430.00	H29.6.16収載/先発・代表薬に同一剤形なし

【適応】①頻脈性不整脈(上室性)。②手術時の異常高血圧の救急処置。③高血圧性緊急症。④不安定狭心症。【用法】①1回10mg, 約3分間で緩徐に静注。②[1回静注]1回10mg, 約1分間で緩徐に静注。[点滴静注]5~15 μ g/kg/分。③5~15 μ g/kg/分, 点滴静注。④1~5 μ g/kg/分, 点滴静注。最高用量5 μ g/kg/分。

3122 フルスルチアミン塩酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アリナミンF50注	50mg20mL1管	武田テバ薬品=武田	74.00	先発・代表薬
後	フルスルチアミン静注液50mg「日医工」	50mg20mL1管	日医工ファーマ=日医工	56.00	H29.6.16収載

【適応】ビタミンB₁欠乏症の予防・治療。ビタミンB₁の需要が増大し, 食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患, 甲状腺機能亢進症, 妊産婦, 授乳婦, 激しい肉体的労働時等)。ウェルニッケ脳症。脚気衝心。次の疾患のうちビタミンB₁の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合/神経痛, 筋肉痛, 関節痛, 末梢神経炎, 末梢神経麻痺, 心筋代謝障害, 便秘等の胃腸運動機能障害, 術後腸管麻痺。【用法】フルスルチアミンとして1日5~100mg, 静注。

3321 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	アドナ注(静脈用)100mg	0.5%20mL1管	田辺三菱=田辺販売	100.00	先発・代表薬
後	カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「トーフ」	0.5%20mL1管	東和薬品	56.00	H29.6.16収載

【適応】毛細血管抵抗性の減弱及び透過性の亢進によると考えられる出血傾向(紫斑病等)。毛細血管抵抗性の減弱による皮膚・粘膜・内臓からの出血, 眼底出血・腎出血・子宮出血。毛細血管抵抗性の減弱による手術中・術後の異常出血。【用法】1日25~100mg, 静注又は点滴静注。

★処方・調剤の際は必ず最新の添付文書をご確認ください★

3999i アレンドロン酸ナトリウム水和物

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	ボナロン点滴静注バッグ900μg	900μg100mL1袋	帝人ファーマ	4,627.00	先発・代表薬
後	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「DK」	900μg100mL1袋	大興＝陽進堂＝江州	2,131.00	H29.6.16収載
後	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	900μg100mL1袋	光	2,131.00	H29.6.16収載

【適応】骨粗鬆症。【用法】アレンドロン酸として1回900μg、4週に1回、30分かけて点滴静注。

3999i オザグレルナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	カタクロット注射液20mg	20mg2.5mL1管	小野	1,124.00	先発・代表薬
	キサンボンS注射液20mg	20mg2.5mL1管	キッセイ	809.00	先発・代表薬
後	オザグレルNa点滴静注液20mg「トーフ」	20mg1mL1管	東和薬品	399.00	H29.6.16収載
後	オザグレルNa点滴静注液80mg「トーフ」	80mg4mL1管	東和薬品	1,042.00	H29.6.16収載

【適応】①クモ膜下出血術後の脳血管攣縮及びこれに伴う脳虚血症状の改善。②脳血栓症(急性期)に伴う運動障害の改善。【用法】①1日80mg、24時間かけ持続静注。術後早期に開始し、2週間持続投与が望ましい。②1回80mg、2時間かけ1日朝夕2回持続静注、約2週間実施。

3999i ナファモスタットメシル酸塩

	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
	注射用フサン50	50mg1瓶	鳥居	2,445.00	先発・代表薬
後	ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「日医工」	100mg1瓶	日医工	1,064.00	H29.6.16収載／先発・代表薬に同一規格なし

【適応】①汎発性血管内血液凝固症(DIC)。②出血性病変又は出血傾向を有する患者の血液体外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析及びプラズマフェレーシス)。【用法】①1日量を0.06～0.2mg/kg/時で24時間かけて持続静注。②体外循環開始に先だち20mgを生理食塩液500mLに溶解した液で血液回路内の洗浄・充てんを行う。体外循環開始後は20～50mg/時、持続注入。

3999i ヒアルロン酸ナトリウム

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	備考
	アルツ関節注25mg	1%2.5mL1管	生化学＝科研	1,180.00	○	先発・代表薬
後	ヒアルロン酸Na関節注25mg「トーフ」	1%2.5mL1管	東和薬品	401.00	○	H29.6.16収載
	アルツディスポ関節注25mg	1%2.5mL1管	生化学＝科研	1,348.00	○	先発・代表薬
	スベニールディスポ関節注25mg	1%2.5mL1管	中外	1,201.00	△	先発・代表薬
後	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「トーフ」	1%2.5mL1筒	東和薬品	571.00	○	H29.6.16収載

【適応】①変形性膝関節症、肩関節周囲炎。次の基準を全て満たす関節リウマチにおける膝関節痛/抗リウマチ薬等による治療で全身の病勢がコントロールできていても膝関節痛のある場合、全身の炎症症状がCRP値として10mg/dL以下の場合、膝関節の症状が軽症～中等症の場合、膝関節のLarsen X線分類がGrade I～Ⅲの場合。【用法】①1回25mg(2.5mL)、1週間ごとに連続5回膝関節腔内又は肩関節(肩関節腔、肩峰下滑液包又は上腕二頭筋長頭腱鞘)内投与。(以下、スベニールのみ)変形性膝関節症で症状の維持を目的とする場合、2～4週間隔。※△は一部用法が異なることを示す。

6249i リネゾリド

	商品名	規格単位	会社名	薬価	①	②	備考
	ザイボックス注射液600mg	600mg300mL1袋	ファイザー	14,997.00	○	○	先発・代表薬
後	リネゾリド注射液600mg「サワイ」	600mg300mL1袋	沢井	9,260.00	—	○	H29.6.16収載

【適応】①<適応菌種>本剤感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)。<適応症>敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷・手術創等の二次感染、肺炎。②<適応菌種>バンコマイシン耐性エンテロコッカス・フェシウム。<適応症>各種感染症。⇒(①はザイボックスのみ)【用法】①②〔成人・12歳以上の小児〕1日1200mg、2回分割(1回600mgを12時間ごと)、30分～2時間かけて点滴静注。〔12歳未満の小児〕1回10mg/kg、8時間ごと、30分～2時間かけて点滴静注。1回600mgまで。

以上

薬効・薬価リスト平成29年版 追補情報(平成29年6月)

IV. ジェネリック(後発医薬品)以外の記載品目

平成29年6月15日告示(16日適用)品目における、診療報酬上の後発医薬品以外の品目をまとめています(平成29年7月3日現在, 入手できた情報による)。

投与	商品名	規格単位	会社名	薬価	備考
内	オルメテックOD錠5mg	5mg1錠	第一三共	31.50	H29.6.16収載/同一規格の代表薬としてIのリストにも掲載
内	ケトチフェンシロップ0.02%「日医工」	0.02%1mL	日医工=高田	19.80	H29.6.16収載
内	ホスレノールOD錠250mg	250mg1錠	バイエル	169.70	H29.6.16収載
内	ホスレノールOD錠500mg	500mg1錠	バイエル	249.00	H29.6.16収載
注	アクチット輸液	200mL1袋	興和=扶桑	163.00	H29.6.16収載
注	アクチット輸液	500mL1袋	興和=扶桑	199.00	H29.6.16収載
注	ヴィーン3G輸液	200mL1袋	興和=扶桑	138.00	H29.6.16収載
注	ヴィーン3G輸液	500mL1袋	興和=扶桑	173.00	H29.6.16収載
注	ヴィーンD輸液	200mL1袋	興和=扶桑	163.00	H29.6.16収載
注	ヴィーンD輸液	500mL1袋	興和=扶桑	193.00	H29.6.16収載
注	ヴィーンF輸液	500mL1袋	興和=扶桑	145.00	H29.6.16収載

以 上