

本文 p.146 適応・用法欄

般 パロキセチン塩酸塩水和物（1179i 精神神経用剤／その他）

【適応】〔パキシル CR〕うつ病・うつ状態。〔その他〕①うつ病・うつ状態。②パニック障害。③強迫性障害。④社会不安障害。⇒（④はパキシル錠のみ）

【用法】〔パキシル CR〕初期量 1 日 1 回 12.5mg, 夕食後。その後 1 週間以上かけて 1 日 25mg に増量。1 日 50mg まで。いずれも 1 日 1 回夕食後。増量は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日 12.5mg ずつ。〔その他〕①1 日 1 回 20～40mg, 夕食後。1 回 10～20mg より開始, 原則として 1 週ごとに 10mg/日ずつ増量。1 日 40mg まで。②1 日 1 回 30mg, 夕食後。1 回 10mg より開始, 原則として 1 週ごとに 10mg/日ずつ増量。1 日 30mg まで。③1 日 1 回 40mg, 夕食後。1 回 20mg より開始, 原則として 1 週ごとに 10mg/日ずつ増量。1 日 50mg まで。④1 日 1 回 20mg, 夕食後。1 回 10mg より開始, 原則として 1 週ごとに 10mg/日ずつ増量。1 日 40mg まで。

本文 p.233, p.263, p.267, p.286 剤形・規格単位欄

般 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物（2399i その他の消化器官用薬／その他）

（誤）クリム 5mg1 錠 → （正）トロチ 5mg1 錠

般 セチルピリジニウム塩化物水和物（2399i その他の消化器官用薬／その他）

（誤）クリム 2mg1 錠 → （正）トロチ 2mg1 錠

般 デカリニウム塩化物（2399i その他の消化器官用薬／その他）

（誤）クリム 0.25mg1 錠 → （正）トロチ 0.25mg1 錠

般 フルルピプロフェン（2649i 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤／その他）

ヤクバンテープ 60mg に対し「貼付剤 (2)15cm×14cm1 枚」を追加。

本文 p.283 商品備考欄

般 フルオシノニド（2646 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤／副腎皮質ホルモン製剤）

トプシムクリーム 0.05% （誤）O/W 型 → （正）FAPG 基剤

トプシム E クリーム 0.05% （誤）W/O 型 → （正）O/W 型乳剤性基剤

以上, 恐れ入りますが赤字部分を追記・訂正くださいますようお願い申し上げます。