

本文 p.153 適応・用法欄



パキシル (1179i 精神神経用剤/その他)

【適応】〔パキシルCR〕うつ病・うつ状態。〔その他〕①うつ病・うつ状態。②パニック障害。③強迫性障害。④社会不安障害。⇒ (④はパキシル錠のみ)



【用法】〔パキシルCR〕初期量1日1回12.5mg, 夕食後。その後1週間以上かけて1日25mgに増量。1日50mgまで。いずれも1日1回夕食後。増量は1週間以上の間隔をあけて1日12.5mgずつ。〔その他〕①1日1回20~40mg, 夕食後。1回10~20mgより開始, 原則として1週ごとに10mg/日ずつ増量。1日40mgまで。②1日1回30mg, 夕食後。1回10mgより開始, 原則として1週ごとに10mg/日ずつ増量。1日30mgまで。③1日1回40mg, 夕食後。1回20mgより開始, 原則として1週ごとに10mg/日ずつ増量。1日50mgまで。④1日1回20mg, 夕食後。1回10mgより開始, 原則として1週ごとに10mg/日ずつ増量。1日40mgまで。

本文 p.383, p.395, p.415 剤形・規格単位欄

アズノール ST (2399i その他の消化器官用薬/その他)

(誤) 5mg1錠 → (正) 5mg1錠

S P (2399i その他の消化器官用薬/その他)

(誤) 0.25mg1錠 → (正) 0.25mg1錠

スプロール (2399i その他の消化器官用薬/その他)

(誤) 2mg1錠 → (正) 2mg1錠

本文 p.423 商品備考欄

トプシム (2646 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤/副腎皮質ホルモン製剤)

トプシムクリーム0.05% (誤) O/W型 → (正) FAPG基剤

トプシムEクリーム0.05% (誤) W/O型 → (正) O/W型乳剤性基剤

付録 p.1 後発除外品目 本文参照ページ

ソルデム 3PG 輸液 (誤) 295 → (正) 296

以上、恐れ入りますが赤字部分を追記・訂正くださいますようお願い申し上げます。